

Dedicatorias

A Dios

Gracias por acompañarme siempre en los momentos difíciles de mi vida, pues gracias a ti pude terminar satisfactoriamente mis estudios y por cuidar a mi familia en las horas de mi ausencia pues al poner mi vida y voluntad en ti los protegiste con tu manto divino

Tal vez no soy quien debería ser pero doy gracias a dios por no ser lo que antes fui.

Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar.

Valor para cambiar aquellas que si puedo y sabiduría para distinguir la diferencia.

A mi madre: Guadalupe Zapien Villa

Dedico el presente trabajo a mi MADRE por estar siempre a mi lado por su constante ayuda y consejos que de ella e recibido.

Pues ella fue es y seguirá siendo el apoyo incondicional el bastón en el que me puedo apoyar y sostener en los momentos de debilidad. A ti que con mucho esfuerzo me sacaste adelante, aun con todas las angustias, preocupaciones y todos los dolores de cabeza que te di nunca me dejaste solo.

Gracias LUPITA

A MI PADRE: Juan Melendez Neri †

Gracias a ti padre que en gloria estés yo se que tu desde el cielo tu me estas cuidando y el día de hoy estas feliz viendo mi sueño realizarse viendo que mi futuro tal vez empieza a mejorar cuando me siento triste solo recuerdo tu risa y me siento mejor. Solo espero ser un poco como tu.

A mi hermano: Jesús Alberto Melendez Zapien

Gracias carnal por soportarme, que aunque casi nunca estamos de acuerdo y a veces discutimos se que realmente me quieres y también me apoyas, que ni la distancia ni el tiempo, ni nadie podrá separar los lazos que nos unen, que todos los sueños que hemos tenido juntos, dios mediante, los podremos hacer realidad.

AMI ABUE: MICKAELA VILLA HINOJOS

Dedico este trabajo a mi abue que siempre con sus palabras positivas y sus consejos me alentaron a seguir y no darme por derrotado, a creer que solo dios podría ayudarme. El día de hoy tus oraciones a dios fueron escuchadas y dios me esta ayudando a cambiar espero dios te siga dejando a mi lado por muchos años mas porque aun te necesito conmigo.

A MIS TIAS: Ma. Del pilar, Socorro Imelda, Lourdes y Dolores Zapien Villa

Por ser unas segundas madres en mi vida por tener en verdad que soportarme cada vez por sus horas de desvelo, que nunca podre pagar los tragos amargos que las hice pasar, espero en dios ya no se sigan acumulando. Gracias por ser como son, ustedes son parte importante de mi mundo y aunque no lo parezca a veces, las quiero muchísimo y este trabajo también es pensando en ustedes.

A MI TIO: Fabián Zapien Villa

Gracias tío por ser un segundo padre que con tu tenacidad, perseverancia, honestidad y carácter eres un ejemplo a seguir. Tal vez a veces o casi siempre necesito una mano fuerte y se que ahí estarás tu para acomodarme las ideas.

*AMIS PRIMOS: Pablo, francisco, Abel, fabian, David, Carolina, Enrique,
Pilar, Erika, Humberto y paulina*

*Que cuando la soledad me quería abatir hablar con ustedes y escuchar sus locuras
me hacían sentir mejor. Gracias por darme su apoyo*

AGRADECIMIENTOS

A MI ALMA TERRA MATER:

*Gracias por darme los conocimientos que al día de hoy he obtenido. Gracias por
darme un futuro mejor al que estaba destinado y hoy tengo realmente esperanza
para vivir el mañana cada vez mejor. A mis profesores que con sus enseñanzas
puedo enfrentar mi vida profesional a todos ellos gracias.*

A MIS AMIGOS:

*Juan Raymundo Ponce, Victor Edel Segovia ,Maria Esther Rodríguez
Echevarría, Juan francisco Zamarripa Pérez Que incondicionalmente me
ofrecieron su amistad y me apoyaron tanto en trabajos de la universidad así como
en esta tesis que sin ellos no hubiese sido posible terminarla que con sus bromas y
risas me hicieron menos rutinario mi diario de vivir siempre estaré agradecido con
cada uno de ellos tanto por soportarme como comprenderme siempre estarán en
donde quiera que me encuentre estarán en mis pensamientos*

A MIS COMPAÑEROS DE CLASE

*Como quiera que halla sido fueron 5 años de convivencia que hubo roces y
choques pero al ultimo siempre nos volvíamos a juntarnos*

A MI GRUPO DE AA HORIZONTE 24 HRS DE CIUDAD LERDO

*Estoy completamente agradecido con dios y con el grupo pues sin ellos estaría
aún en el bosque de sombras donde yo me encontraba y no encontraba el camino
hacia una vida realmente útil y feliz, ellos con serenidad y mucha tolerancia
supieron guiarme y me enseñaron a vivir.
Gracias espero no fallarles.*

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

*Agradezco a todas aquellas personas que creyeron en mi desde el principio, pero
también agradezco a las que en mi nunca creyeron y tal vez aun no crean en mi
capacidad, son ellos los que también me impulsan a superarme, a esas personas
que pensaban que ni el primer semestre iba a terminar ahora les puedo gritar ya
soy medico veterinario zootecnista.*

INDICE

| | |
|--|----|
| RESUMEN | 3 |
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| HIPÓTESIS | 5 |
| OBJETIVO | 6 |
| I. GENERALIDADES DE LOS PROTOZOARIOS | 6 |
| 1.1 Características..... | 8 |
| II. HISTORIA de <i>Giardia spp.</i> | 9 |
| III. INFECCIÓN POR <i>Giardia</i> | 10 |
| 3.1 Sinonimias | 11 |
| 3.2 Agente Etiológico..... | 12 |
| 3.3 Clasificación Taxonómica | 15 |
| IV. CICLO BIOLÓGICO | 16 |
| V. EPIDEMIOLOGÍA..... | 19 |
| VI. PATOGENIA | 21 |
| 6.1 Factores que Influyen en la Patogenia..... | 22 |
| 6.1.2 Predisponibilidad de Huésped. | 22 |
| 6.1.3 Dependientes del Medio. | 23 |
| VII. SIGNOS | 24 |
| VIII. LESIONES | 25 |
| IX. DIAGNÓSTICO..... | 26 |
| 9.1 De Laboratorio..... | 26 |
| 9.2 Diagnóstico diferencial..... | 31 |
| X. TRATAMIENTO | 33 |
| 10.1. Los Fármacos de Elección son: | 33 |
| PREVENCIÓN Y CONTROL | 39 |
| XII. ZOONOSIS..... | 42 |
| XIII. MATERIAL Y MÉTODOS | 44 |
| XIV. RESULTADOS | 48 |
| XV. DISCUSIÓN | 49 |
| XVI. CONCLUSION | 50 |
| XVII. LITERATURA CITADA..... | 51 |

Índice de figuras

FIGURA 1 trofozoitos

FIGURA 2 Quiste

FIGURA 3 Esquema del trofozoito

FIGURA 4 Esquema del quiste

FIGURA 5 Trofozoito emergiendo de un quiste

FIGURA 6 División binaria de giardia

FIGURA 7 Ciclo de giardia

FIGURA 8 Kit de diagnóstico de giardiasis

FIGURA 9 Forma enquistada de giardia spp

FIGURA 10 Fotomicrografía de giardia adosada a la mucosa

FIGURA 11 Desinfección del área

FIGURA 12 Baño para eliminar material fecal del pelaje

RESUMEN

Este trabajo se realizó durante los meses de noviembre a mayo del año 2007 en el criadero energy dog de la ciudad Juárez nuevo león México. Se recolectaron un total de 35 muestras de heces fecales caninas, las cuales se analizaron mediante la Técnica de Flotación con Solución Salina.

El porcentaje de prevalencia de *Giardia* obtenido durante el estudio fue del 0%; que es menor al promedio normal realizados en estudios anteriores.

En el presente estudio se encontró que ha disminuido notablemente la presencia de *Giardia*, lo cual se debe a la mayor disseminación de información tanto en la salud animal como en la salud humana, sin embargo, aún existe desconocimiento en cuanto a las atenciones que deben tener los animales, por ejemplo, la desparasitación general.

La *Giardia* es un parásito del intestino delgado principalmente del humano, perro y otros mamíferos.

INTRODUCCIÓN

La parasitosis o enfermedad parasitaria sucede cuando los parásitos encuentran en el huésped las condiciones favorables para su anidamiento, [desarrollo](#), multiplicación y virulencia, de modo que pueda ocasionar una enfermedad (Binda *et al.*, 2006).

Debido a que los parásitos están bien adaptados a sus modos de vida, son difíciles de destruir, desarrollan [estrategias](#) para evitar los mecanismos de defensa de sus huéspedes y muchos han conseguido ser resistentes a los medicamentos e insecticidas que se aplican para su [control](#) (Binda *et al.*, 2006).

La *Giardia* es un parásito protozoario flagelado residente del tubo intestinal humano y de muchas clases de animales. Las encuestas de prevalencia en poblaciones caninas son: 10% en perros bien tratados, 36 a 50% en cachorros y hasta el 100% en criaderos (Binda *et al.*, 2005).

El hecho de que la prevalencia en gatos sea mucho menor (1.4-11%) puede reflejar la dificultad para identificar el organismo en las heces de éstos (Binda *et al.*, 2005).

Si bien la prevalencia de infección es elevada en perros y gatos, la enfermedad clínica es rara. La importancia de la afección reside en su prevalencia, seriedad cuando emerge, potencial zoonótico y dificultades en el diagnóstico además de algunos inconvenientes en la farmacoterapia (Binda *et al.*, 2005).

HIPÓTESIS

Los perros que están confinados ya sea en criaderos con demasiada población o en condiciones deficientes son propensos a estar parasitados aun estén constantemente controlada su desparasitacion y vacunas

Tratar de comprobar mediante la Técnica de Flotación con Solución de Willis (solución sobresaturada de Cloruro de Sodio o sal común). Realizando un estudio en 35 pruebas a perros de el criadero energy dog de la ciudad Juárez nuevo león México

OBJETIVO

Encontrar resultados positivos a guardia en los perros de criadero ENERGY DOG de la ciudad Juárez nuevo león México ya sean hembras, machos de diferente edad de las razas pastor alemán y pastor belga mallinois.

I. GENERALIDADES DE LOS PROTOZOARIOS

Del griego *protos*, primero y *zoon*, animal; son en su mayor parte [animales](#) unicelulares de tamaño microscópico. Constituyen el mas pequeño de todos los grades [grupos](#) o tipos del Reino animal que se diferencian de todos los demás, que son pluricelulares y que están formados por [tejidos](#) y se les llama Metazoos (del griego meta, después) (Aycachi, 2004).

Por su [estructura](#) los protozoos se parecen a una [célula](#) de los Metazoos, pero funcionalmente son organismos completos, equilibrados fisiológicamente y realizan todas las [funciones](#) esenciales de un animal (Boch, 1982).

Algunos son de estructura muy simple y otros complejos, con orgánulos (celulares) que sirven para determinados [procesos](#) vitales y funcionalmente son análogos a los [sistemas](#) de órganos de los animales pluricelulares (Aycachi, 2004).

Se conocen 30 000 especies de protozoos diferentes, y el numero de individuos es superior al de todos los demás animales. Cada especie vive en un [ambiente](#) húmedo particular: en [el agua](#) de mar o en el fondo del océano, en [tierra](#), en las aguas dulces, salobres o corrompidas; en el [suelo](#) o en la sustancia orgánica en descomposición (Mehlhorn *et al.*, 1994). Muchos viven y nadan libremente, mientras que otros son sedentarios, y en ambas categorías los hay coloniales. Otros viven encima o en el interior de algunas especies de [plantas](#) y de toda [clase](#) de animales desde otros protozoos al [hombre](#). En cada caso varia la relación con el huésped, pues puede llegar a ser meramente

casual hasta un parasitismo estricto. Muchos protozoos sirven de alimento a otros animales pequeños. Algunos son útiles en la purificación de los lechos de filtraje o alcantarillado, pero las especies productoras de [enfermedades](#) como la Disentería amebiana, la malaria o la enfermedad del sueño son de un gran riesgo para la humanidad (Mehlhorn *et al.*, 1994).

1.1 Características

- Los protozoarios son pequeños, unicelulares, algunos coloniales con pocos o numerosos individuos todos iguales; sin simetría o con simetría bilateral, radial o esférica.
- Su forma celular generalmente constante, ovalada, alargada, esférica u otra, en algunas especies.
- El núcleo diferenciado, único o múltiple; otras partes estructurales como orgánulos; sin órganos o tejidos.
- Su locomoción por flagelos, pseudópodos, cilios o movimientos de la propia célula.
- Algunas especies con cápsulas protectoras o testas; muchas especies forman quistes o esporas resistentes para sobrevivir a las condiciones adversas o para la dispersión.
- De vida libre, comensales, mutualísticos o parásitos.
- Nutrición variada:
 - Los holozoicos, que se alimentan de otros organismos ([bacterias](#), levaduras, algas, otros protozoos, etc.).
 - Los saprofitos, que se alimentan de sustancias disueltas en su medio.
 - Los saprozoicos, que se alimenta de sustancia animal muerta.

II. HISTORIA de *Giardia spp.*

La *Giardia spp.* Son protozoos flagelado de aspecto piriforme, con dos núcleos, ocho flagelos, y un disco suctor en la parte ventral. Descubiertos por Loewenhoeck en 1681, al analizar sus propias materias fecales, fueron descritas científicamente por vez primera en 1859, por Lambel. *Giardia canis* Hegner, 1992, afecta a los cánidos, especie incluida dentro del grupo de *Giardia duodenalis* Davaine, 1875, sinónimo de *Giardia lamblia* y *Giardia intestinales*. (Cordero del Campillo, 2001).

III. INFECCIÓN POR *Giardia*

La Giardiasis produce una enfermedad digestiva aguda o crónica, caracterizada por diarrea y pérdida de peso en gatos, perros y otros mamíferos (Morgan, 2004).

Las giardias parasitan el intestino delgado de los mamíferos por medio de trofozoítos resistentes en el lumen, anaerobios y frágiles. Su supervivencia ambiental entre los huéspedes se logra en quistes inmóviles, latentes y resistentes. No requiere intermediario para completar su ciclo normal (Greene, 1993).

Parece ser que hay por lo menos tres tipos de Giardia:

1. *Giardia lamblia* (*Giardia duodenalis*) en los mamíferos.
2. *Giardia muris* en los ratones.
3. *Giardia rane* en las ranas. Pero podría haber más.(Browman, 2004)

Sus principales hospederos son:

- Hombre
- Perros
- Gatos
- Bovinos
- Ovejas
- Cabras
- Llamas
- Animales salvajes
- Y otros mamíferos domésticos (Browman, 2004).

3.1 Sinonimias

Giardiasis, Giardiosis.

3.2 Agente Etiológico

Las especies del género *Giardia spp.* Son de piriformes a elípticas, con simetría bilateral. El extremo anterior es marcadamente redondeado, y el posterior, sobresaliente y algo puntiagudo. La cara dorsal es convexa, y la ventral cóncava, con un disco suctor grande en su mitad anterior. Tienen dos núcleos, dos axóstilos, ocho flagelos dispuestos en cuatro pares, y un par de cuerpos medios que se tiñen muy oscuros (Figura 1). Forman quistes que son ovales o elípticos y poseen dos o cuatro núcleos (Figura 2) (Soulsby, 1987; Browman, 2004).



Figura 1. Trofozoítos




Figura 2. Quiste

El parasito tiene dos formas: el trofozoíto y el quiste (Soulsby, 1987; Greene, 2000; Barr *et al.*, 2004; Browman, 2004).

1. La forma motil que habita en la luz intestinal, es el trofozoíto, tiene aproximadamente quince milimicras de largo y ocho de ancho, y se

identifica con facilidad en la microscopia de luz por su aspecto en “cara sonriente” formada por los dos núcleos en el tercio anterior (que constituyen los ojos), los axones que pasan en sentido longitudinal entre los núcleos (forman la nariz) y los cuerpos medianos (que constituyen la boca) situados en sentido transversal en el tercio posterior. El aspecto bastante cómico de esta estructura se completa con cuatro pares de flagelos (Soulsby, 1987; Greene, 2000).



Nu. Dos núcleos.

K. Cariosoma nuclear

MB. Cuerpos medios.

Ax. Axonemas.

Fg. Flagelos.

AD. Disco adhesivo ventral.

Figura 3. Esquema de Trofozoíto de *Giardia spp.*

2. La segunda forma, el quiste, es el que se transmite y sobrevive en el ambiente. Tiene alrededor de 12 milimicras de largo y 7 de ancho. Debido a que tiene dos trofozoítos separados de manera incompleta, pero formados, es posible observar en su interior los axonemas y

fragmentos de los discos ventrales y hasta cuatro núcleos (ver Figura 4). El quiste resulta susceptible a la desecación en condiciones de calor y resequedad, pero puede sobrevivir durante varios meses fuera del huésped en ambientes húmedos y fríos (Green, 2002; Barr *et al.*, 2004; Bowman, 2004).




Figura 4. Esquema de Quiste de *Giardia spp.*

3.3 Clasificación Taxonómica

Si bien algunos autores sugieren la existencia de una especie propia de los caninos, a la que denominan *Giardia canis*, otros más cautelosos optan por denominar al parásito del perro con su género taxonómico, sin abrir juicio sobre su especificidad (Brinda *et al.*, 2003).

Phylum. Protozoa

Subphylum. Sarcomastigophora. Tiene movimientos de locomoción por medio de flagelos y o pseudópodos.

Superclase. Mastigosphora. Se mueven por flagelos y se dividen simétricamente.

Clase 2. Zoomastigophora. No tienen clorofila.

Orden. Diplomonadida. Tienen el cuerpo con simetría bilateral, con dos núcleos similares y cuatro pares de flagelos.

Familia. Hexamitidae.

Género. Giardia. (Quiroz, 1999)

IV. CICLO BIOLÓGICO

El ciclo de vida es directo. La transmisión es oro-fecal (Greene, 2002), después de ingerirse los quistes (trofozoítos no infecciosos) se enquistan en el duodeno, la parte superior del intestino delgado (Greene, 1993), al exponerse a los ácidos gástricos y a las enzimas pancreáticas (Greene, 2002). La citoquinesis de la exquistación es rápida, se inicia a los 5–10 minutos de someter a los quistes a condiciones de exquistación (ver Figura 5), completándose en los 30 minutos siguientes y dando origen a dos trofozoítos binucleados (Alcaraz, 2002).

Los 2 trofozoítos liberados se separan, maduran y se fijan al borde en cepillo del epitelio veloso (en el área glandular) (Greene 2002; Barr, 2004) a través de un disco central adherente (Greene, 1993) y se traslade de un sitio de fijación a otro utilizando los flagelos (Greene 2002). En los perros el organismo fue aislado desde el duodeno hasta el íleon; el duodeno y yeyuno son residencias óptimas (Barr *et al.*, 2004). Pruebas circunstanciales indican que los trofozoítos ocupan el intestino superior (duodeno) en los caninos infectados con síntomas, y en el inferior (yeyuno) en aquellos asintomáticos (Greene 2002). Los trofozoítos se multiplican por fisión binaria (ver Figura 6) en el intestino y luego se enquistan (Barr *et al.*, 2004). Las sales biliares y los ácidos grasos en un pH ligeramente alcalino estimulan el enquistamiento de los trofozoítos (Greene, 2002). El estímulo que induce la enquistación de *Giardia*, tanto *in vitro* como *in vivo* es la ausencia de colesterol, ya que la adición de colesterol del medio bloquea la enquistación. Aunque el mecanismo no es

conocido, se piensa que la deficiencia de colesterol altera la permeabilidad de las membranas de los trofozoítos, y directa o indirectamente se pueden activar una serie de mecanismos de transducción que culminan en la expresión de los genes específicos de la enquistación (Alcaraz, 2002).




Figura 5. Trofozoíto Emergiendo de un Quiste.




Figura 6. División Binaria de la *Giardia*.

Los trofozoitos se eliminan a través de las heces, mientras que los quistes se expulsan una o dos semanas post infección de manera rutinaria.

Los quistes expulsados son inmediatamente infecciosos si se ingieren (Barr *et al.*, 2004).

El periodo prepatente en perros es de 6 a 12 días (con un promedio de 8 días). Cuando se inicia la enfermedad puede ser seguida de eliminación de quistes uno o dos días (Greene, 1993).



Figura 7. Ciclo de las Giardia.

V. EPIDEMIOLOGÍA

La *Giardia* es una enfermedad cosmopolita. Siendo su frecuencia mayor en zonas Tropicales y Subtropicales donde la temperatura y la humedad aunado a las malas condiciones higiénicas favorecen su transmisión (Cañete *et al.*, 2004).

Es frecuente, en animales domésticos, especialmente en los perros y gatos; se presenta con relativa frecuencia en animales salvajes como los castores. La transmisión a partir de la exposición a quistes del parásito provenientes de fuente animal ha sido reportada, a pesar de reconocerse como una vía no común de adquisición de la infección (Cañete *et al.*, 2004).

La principal fuente de transmisión es la oro-fecal y el nivel de infección es proporcional a las medidas higiénico-sanitarias de los animales. La contaminación de alimentos por quistes de *Giardia* y el agua, son otros de los elementos que hay que tener en cuenta en la aparición de brotes de giardiosis (Cañete *et al.*, 2004).

La fuente de infección más importante son los animales enfermos y los portadores asintomáticos, eliminadores de quistes, ya que contaminan el entorno, alimentos y agua. Los adultos eliminan bajas cantidades de quistes, pero las hembras en gestación o en periodo de lactancia son otra fuente importante de infección para los cachorros. Esto se debe al aumento de hormonas inmunosupresoras, como la progesterona, estrógenos y prolactina. Los roedores, moscas, mosquitos o cucarachas, actúan igualmente como

fuentes de infección para perros y gatos. No debe olvidarse el carácter zoonótico de esta enfermedad (Cordero del Campillo *et al.*, 2002).

VI. PATOGENIA

Las *Giardia spp*, ejercen su acción patógena de varias formas:

- Por un mecanismo traumático irritativo, sobre las células intestinales lo que ocasiona acortamiento de las microvellosidades intestinales y destrucción del borde en cepillo de las células. Como consecuencia hay importantes alteraciones en la digestión y un cuadro general de mala absorción, siendo los ácidos grasos los más comprometidos, así como azúcares, vitaminas y proteínas. Ello se debe también a una menor actividad de las disacaridasas

(Cordero del Campillo *et al.*, 2002)

- Ejercen así mismo una acción exfoliadora de los principales elementos nutricionales, tomando para su propio metabolismo, proteínas, hidratos de carbono, ácido fólico, lactasa, sucrosa, grasas del hospedador e interfiriendo con el metabolismo de éste (Contreras, 2004).
- Se ha demostrado que las *Giardia spp*, tienen igualmente una acción vectorial importante ya que son capaces de transportar en su interior a otros agentes patógenos, virus, bacterias, micoplasmas, hongos y recientemente se ha descubierto la presencia de virus VIH-1. Por otro lado, actúan como precursoras y desencadenantes de otras afecciones que padecen perros y gatos, tales como moquillo, parvovirus, entre otras (Cordero del Campillo *et al.*, 2002).

6.1 Factores que Influyen en la Patogenia

6.1.1 Dependientes del Parásito.

Influye el tipo de cepa, la patogenicidad inherente de cada una de ellas. La cantidad de quistes ingeridos, con mayor posibilidad de desarrollo cuanto mayor sea el número, aunque un solo quiste es capaz de desarrollar un cuadro patológico. La forma de presentación del parásito, quistes o trofozoítos, pues éstos tienen menor capacidad infectiva que aquellos. (Cordero del Campillo *et al.*, 2002)

6.1.2 Predisponibilidad de Huésped.

La distribución de los trofozoítos dentro del intestino varía según el huésped y la dieta. En perros una dieta alta en carbohidratos en vez de abundante en proteínas puede favorecer la residencia de trofozoítos en el intestino delgado (duodeno) y de esta manera favorecer un hábitat intestinal para la *giardia spp* (Poloni, 2006).

La edad constituye quizá el factor más importante ya que los animales comprendidos entre uno y ocho meses de edad, son los mayormente afectados, independientemente de la raza y el sexo (Olson *et al.*, 2001).

El estado sanitario y nutricional, en general, si es bueno, previene en cierta medida la aparición del proceso. De igual forma, la situación inmunológica, si se encuentra comprometida por situaciones de estrés, procesos patológicos o carenciales, favorecen el asentamiento del parásito y su posterior desarrollo (Cordero del Campillo *et al.*, 2002).

El calostro, en la especie humana, tiene un papel protector muy importante en el lactante, pero este aspecto no se ha podido demostrar aun en perros y gatos (Cordero del Campillo *et al.*, 2002).

6.1.3 Dependientes del Medio.

La humedad y temperatura del medio, la higiene de los locales y el manejo de los animales son factores que influyen en la presentación del proceso. Por la poca especificidad de giardia spp., la presencia de otros hospedadores como roedores, otros mamíferos y animales silvestres, pueden contaminar el medio y desencadenar el proceso posteriormente en los carnívoros, perros y gatos (Cordero del Campillo *et al.*, 2002).

VII. SIGNOS

La giardiosis puede presentarse bajo dos formas:

- Asintomático, donde no se observan signos clínicos y los animales afectados actúan como reservorios para el resto del colectivo (Mehlhorn *et al.*, 1994; Contreras, 2004). Sin embargo, en algunas ocasiones son perros de bajo peso que no responden a tratamientos como las vitaminas o los tónicos, y que, además, son susceptibles a contraer otras enfermedades digestivas, no obstante, al realizarles un examen coproparasitario, dan positivo al diagnóstico de quistes de giardia (Aiello y Maiz, 2000; Contreras, 2004).
- De curso agudo, crónico caracterizado por diarrea mucosa con abundante grasa (esteatorrea) diarrea con sangre, que acontece al cuarto o quinto día post infección, las heces blandas pálidas de olor muy fétido, que se alternan con periodos de estreñimiento y heces normales, fiebre que puede alcanzar los 40 grados centígrados , anorexia, pérdida del apetito, distensión y dolor abdominal, pelo sin brillo, deshidratación en grado diverso, fatiga , dermatosis alérgica, neurosis astenica y ocasionalmente, muertes en los animales afectados (Bianciardi *et al.*, 2004).

VIII. LESIONES

En el intestino se observa un fuerte proceso inflamatorio, de tipo mucoide, con acortamiento y destrucción de las microvellosidades, infiltración con linfocitos, macrófagos y eosinófilos. En la sangre se aprecian hemoconcentración, linfocitosis y una ligera eosinofilia que no suele sobrepasar el 12-15% (Campillo del Cordero *et al.*, 2002).

Hoy en día no se han identificado alteraciones histológicas específicas en la mucosa del intestino delgado, sin embargo, se relacionan factores patogénicos dependientes del parásito con el esfacelo normalmente rápido de células del epitelio intestinal que conduce a la falta de diferenciación completa de las células epiteliales nuevas que surgen de las criptas en células cilíndricas con microvellosidades. El acortamiento de las vellosidades y microvellosidades intestinales reduce el área de superficie de absorción (Greene, 2002).

IX. DIAGNÓSTICO

9.1 De Laboratorio

La sintomatología y los estudios de rutina no son patognomónicos de la giardiasis (Brinda *et al.*, 2003)

La detección y tratamiento de la infestación por *Giardia spp* puede presentar resultados muy variables. Algunas veces puede ser muy fácil encontrar los quistes y trofozoitos, y en otras ocasiones puede resultar extremadamente difícil. (Willard, 2005).

Las técnicas para el diagnóstico son:

La Solución de Willis. (Cl Na). Consiste en mezclar dos gramos de heces con solución de Willis (solución sobresaturada de sal común o cloruro de sodio) luego tamizar la mezcla con un filtro fino, centrifugar a 1.500 RPM durante 3 a 5 minutos, se toma una muestra de la superficie del sobrenadante con un asa bacteriológica o una varilla de vidrio, colocando la misma sobre un portaobjeto y cubriendo con un cubreobjeto, luego se realiza la observación en microscopio, para mejorar el contraste se puede agregar unas gotas de solución Lugo (Brinda *et al.*, 2005).

Frotis fecales. Ante la sospecha de una giardiasis lo primero es realizar un frotis directo de las heces por los trofozoítos. Los trofozoítos son más comunes en las heces blandas y los quistes en las deposiciones formadas o semiformadas. Una gota de materia fecal se mezcla con otra de solución

salina normal sobre un portaobjetos, se coloca un cubreobjetos y se examina sin pérdida de tiempo a 40 X. Los trofozoítos se reconocen por su rápido movimiento anterógrado y disco ventral cóncavo. La morfología es acrecentada con el agregado de una gota de yodo de Lugol (que mata e inmoviliza al parásito tiñendo las diferentes estructuras internas) a otra de heces. Recuérdese que un resultado negativo no descarta la infección (Barr, 2004).

ELISA fecal. Se han desarrollado análisis inmunoenzimáticos para la detección de la giardiasis humana. Los análisis detectan antígenos fecales producidos por los trofozoítos. Pueden ser algo más eficaces que una sola flotación para el diagnóstico en los perros; son onerosos y presentan dificultades técnicas. No fueron evaluados en felinos. En el hombre tienen 100% de sensibilidad y 96% de especificidad (Contreras, 2004).



Figura 8. Kit de Diagnóstico de Giardiasis.

Inmunofluorescencia directa. Emplea anticuerpos monoclonales con marcación fluorescente para la detección de quistes fecales de *Giardia* y ooquistes de *Cryptosporidium*. Es más sensible que la sucrosa y sulfato de zinc para detectar heces infectadas, sobre todo cuando la concentración de quistes

es reducida. El método requiere instrumental especial y las muestras pueden remitirse en formol al 10% o formol ácido acético-acetato sódico (Barr, 2004).




Figura 9. Forma Enquistada de *Giardia spp.* Evidenciados por Inmunofluorescencia Directa.

Aspirados duodenales. El examen de aspirados duodenales recolectados mediante gastroduodenoscopia por trofozoítos es más eficaz que el sulfato de zinc en una sola muestra fecal de perros con giardiasis clínica. Empero, en casos asintomáticos tiene la misma eficacia que la flotación de una sola muestra fecal (Barr, 2004).

Esto se explica por el hecho de que el organismo coloniza distintas zonas (no siempre el duodeno) del intestino delgado en los perros asintomáticos. Los resultados sugieren que este procedimiento es impráctico para el descarte específico de la giardiasis excepto que se lo realice por otro motivo en un perro con sintomatología compatible. Se irrigan 10 ml de solución salina normal mediante un tubo de polietileno introducido a través del canal del endoscopio; la aspiración procede en forma inmediata. La muestra es

centrifugada (150 G durante 10 minutos) y con el sedimento se hace un extendido (montaje húmedo o secado y teñido con Giemsa) (Barr, 2004).

Concentración en sulfato de zinc. Si el frotis directo resulta negativo se indica la flotación en sulfato de zinc.

Técnica de flotación en sulfato de zinc:

Mezclar por completo 2 g de heces con 15 ml de sulfato de zinc al 33% (33 g de sulfato de zinc en 100 ml de agua destilada; densidad: 1.18).

Tamizar la solución a través de estopilla de algodón o filtro de té.

Verter la solución filtrada en un tubo de centrifuga de 15 ml: los tubos de polipropileno son preferibles a los de poliestireno.

Colocar el tubo en la centrífuga. Si los tubos están en posición vertical, la solución de flotación se añade hasta formarse un menisco inverso. Se le agrega un cubreobjetos y tapón. Si los tubos quedan en posición de ángulo, luego de la centrifugación se recolecta la capa superficial.

Centrifugar a 1500 rpm durante 3-5 minutos.

Retirar el cubreobjetos y colocarlo en el microscopio. En el caso contrario se recolecta la capa superficial de líquido tocando con una varilla de vidrio o asa bacteriológica. Depositar la gota sobre el porta, agregar el cubreobjetos y examinar. Para la tinción de los organismos puede añadirse yodo de Lugol.

Los detritos de la muestra fecal pueden removerse mezclando la muestra con agua y centrifugándola. El sobrenadante es descartado y se añade la solución de sulfato de zinc según lo ya descrito. Cuando hay esteatorrea: la muestra es

mezclada con agua, filtrada y colocada en tubo de centrífuga con 2-3 ml de etil acetato o éter. Después de centrifugar, el sobrenadante es descartado, incluida una capa definida que contiene al solvente orgánico y la grasa. El resto es resuspendido y una gota se tiñe con Lugol y examina.

(Binda *et al.*, 2003, Bowman, 2004)

Prueba de la cuerda peroral. Los contenidos duodenales se obtienen mediante una cuerda de nylon comercial, que es satisfactoria y segura en personas. De 21 pruebas efectuadas en 18 perros con infección, ninguna fue positiva. Debido a su insensibilidad, impracticidad y posible riesgo de ingestión de la cuerda, esta prueba no se recomienda en caninos. No se la evaluó en felinos (Contreras, 2004).




Figura 10. Fotomicrografía Electrónica de *Giardia spp* Adosadas a la Mucosa Intestinal.

9.2 Diagnóstico diferencial

La giardiasis debe diferenciarse de otras causas de mala asimilación de nutrientes (por ejemplo, la insuficiencia pancreática exócrina y la mala absorción intestinal) (Aiello y Mays, 2000).

1. Se deben descartar otras causas de diarrea de intestino delgado:
 - a) Desviación directa
 - b) Enteritis vírica
 - c) Otros parásitos intestinales
 - d) Reacciones a fármacos, tóxicos
 - e) Alergia alimentaria
 - f) Insuficiencia pancreática exócrina
 - g) Enfermedad inflamatoria del intestino, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.
 - h) Neoplasias

2. Descartar otras causas de diarrea en el intestino grueso
 - a) Otros parásitos intestinales
 - b) Enterocolitis bacteriana
 - c) Desviación directa
 - d) Enfermedad intestinal inflamatoria
 - e) Neoplasia

(Morgan, 2004)

Microscópicamente se diferencia de: Los trofozoitos de giardia pueden diferenciarse de los de *Pentatrichomonas hominis* (el único de otros microorganismos que se asemeja a Giardia) porque los últimos tienen movimiento de rodamiento más uniforme, carecen del disco ventral cóncavo, presentan sólo un núcleo y tienen una membrana ondulante. Es posible diferenciar los quistes de oocitos coccidiales y esporocistos por su estructura interna y porque los quistes de giardia captarán yodo, en tanto que los primeros microorganismos no lo absorberán. Las levaduras también se teñirán con yodo, sin embargo, éstas son ovales, no elipsoidales y tienen casi la mitad del tamaño de los quistes de Giardia. (Greene, 2002)

X. TRATAMIENTO

La mayoría de los fármacos utilizados son de uso habitual en humanos (Greene, 1993), y tienen una baja [eficacia](#) o efectos colaterales serios (Barr, 2004). En época reciente, algunos derivados benzimidazólicos (en especial albendazol) demostraron elevada eficacia contra la *Giardia* in vitro (Morgan, 2004).

10.1. Los Fármacos de Elección son:

- El **Albendazol** (25 mg/kg/12 horas, vía oral, durante 2 días) eliminó los quistes fecales en 18 de 20 perros tratados (90% de eficacia). No se comprobaron efectos colaterales en estas dosis ni en Beagles. tratados a razón de 30 mg/kg/día durante 13 semanas. Como se lo sospecha teratogénico, se contraindica en animales gestantes (Barr *et al.*, 2004; Bowman, 2004; Morgan, 2004; Poloni, 2006).
- El **Fenbendazol** (50 mg/kg/día 3 días consecutivos, vía oral) eliminó los quistes fecales en el 100% de los perros (total 6) de [un ensayo](#) controlado. No hubo efectos colaterales y el medicamento no es teratogénico. Con estas dosis pueden tratarse cachorros de 6 semanas de vida. Los resultados sugieren que el fenbendazol solo puede emplearse para tratar giardiasis o descartar una infección oculta (además de trichuriasis) como causa de diarrea crónica en perros (Poloni, 2006).
- El **Metronidazol** vía oral (un nitroimidazol) es un medicamento clásico

para la giardiasis canina (25 mg/kg/12 horas durante 5 días para perros y 12-25 mg/kg/12 horas durante 5 días para gatos). Tiene un 67% de eficacia en perros infectados y se le asoció con la aparición de [anorexia](#) y [vómito](#) agudos con progresión a ataxia generalizada pronunciada y nistagmo posicional vertical (Pérez *et al.*, 1998; Barr *et al.*, 2004; Willard, 2005; Poloni, 2006;). Se piensa que pueden ser mutágenos y carcinógenos. Aunque un estudio epidemiológico en mujeres indica que no aumento el riesgo de cáncer por el uso de metronidazol (Soulsby, 1987; Greene, 1993; Pérez *et al.*, 1998).

- La **Quinacrina** (6,6 mg/kg/12 horas durante 5 días) demostró 100% de eficacia, pero se acompaña con letargia y [fiebre](#) hacia el fin de la terapia en cerca del 50% de los pacientes. Estos efectos desaparecen a los 2 a 3 días de finalizar la medicación. Se la contraindica en preñadas (Pérez *et al.*, 1998)
- **Oxibendazol** en dosis única de 30 mg/kg, el oxibendazol en polvo se mezcló con Nutri plus gel* empleado únicamente como aglutinante, esto se probó en 10 perros positivos a quistes de giardia spp, donde solo 1 continuó con eliminaciones bajas de quistes de giardia spp. y 9 resultaron negativos, esto significa una eficiencia terapéutica superior al 99.5 % (Pérez *et al.*, 1998).
- El **Ipronidazol**, un nitroimidazol, es un aditivo para alimento y [agua](#) usado en el tratamiento de la cabeza negra del pavo y tricomoniasis bovina. En 2 perros galgos fue eficaz para tratar la giardiasis mediante [el](#)

[agua](#) de bebida (126 mg/L durante 7 días y 378 mg/L por otros 7 días).

El tinidazol, otro nitroimidazol, tiene igual eficacia que el metronidazol para tratar la giardiasis. Estos medicamentos no fueron probados a detalle (Binda *et al.*, 2003).

- La **Furazolidona** es de considerable eficacia para la giardiasis felina (4 mg/kg/12 horas durante 5-10 días, vía oral); los posibles efectos colaterales son la diarrea y el vómito. No fue muy evaluada en caninos. Se la presume teratogénica y por ende se contraindica en hembras preñadas (Contreras, 2004).
- **Vacuna:** En perros que fallaron para ser curados para giardiosis mediante los quimioterapéuticos indicados, fueron tratados con una vacuna de Giardia (2-3 inyecciones). Los signos clínicos se resolvieron entre los 16 a 42 días post vacunación y el cese de quistes en las heces fecales fue entre 21 y 71 días. La vacunación es un método potencial para el tratamiento de Giardiosis en perros (Olson *et al.*, 2001).

GIARDIA VAX



Giardia Vax ayuda a la prevención de problemas gastro intestinales en perros ocasionados por Giardia lamblia.

GIARDIA VAX (FORT DODGE)

Inyección subcutánea para uso veterinario.

Composición:

Giardia Vax está elaborada con trofozoitos inactivados (muertos) de Giardia lamblia.

Indicaciones

Giardia Vax ayuda a la prevención de problemas gastrointestinales en perros ocasionado por Giardia lamblia.

Dosis y Vía de Administración:

Administrar asépticamente por vía subcutánea, a cachorros a partir de la octava semana de edad. Se debe reforzar, posteriormente, durante 2 ó 3 semanas.

Se requiere revacunación anual.

Presentación:

- Caja con 25 unidosis.

10.2 Antiprotozoarios Comerciales de Uso Común para Giardia.

| NOMBRE COMERCIAL Y LABORATORIO FABRICANTE | FÁRMACO Y CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN Y DOSIS VÍA ORAL | RECOMENDACIONES |
|---|--|---|---|
| Bendaval gotas (HALVET) | Albendazol La suspensión contiene 5.0 mg en 1 ml. | Suspensión oral: 0.6 ml por cada kilogramo de peso. Se debe administrar por 3 días cada 12 horas. | Se utiliza para el control y tratamiento de los principales parásitos en perros y gatos como: nemátodos, protozoarios (<i>Giardia spp</i>). |
| Bendaval (HALVET) | Albendazol 50 mg. | Una tableta por cada 10 kg de peso. | |
| Febentel- Fenbendazol (TORNELL) | Fenbendazol 100 mg en 1 ml | Suspensión oral: 25 mg por cada kilogramo de peso, por 5 días. | Posee un alto margen de seguridad, puede administrarse en animales gestantes, no tiene efectos teratogénicos. |
| Flagysin (BROVEL) | Metronidazol Cada tableta contiene 150 mg. | Tabletas: 1 tableta por cada 10 kg de peso, cada 12 horas, durante 8 días. | No se utilice en hembras gestantes o en lactancia, ni en animales débiles. |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Metronid (HALVET) | Metronidazol Cada tableta contiene 250 mg. | Tabletas: 1 tableta al día, por 5 a 7 días. | |
| Vitaminthe Reforzado (VIRBAC) | Cada 1 ml contiene: Oxibendazol 45 mg Niclosamida 240 mg. | Pasta oral: 0.5 ml por Kg de peso, lo que equivale a 22.5 mg/kg de Oxibendazol y a 120 mg/kg de Niclosamida. | Puede ser administrado en el alimento o directamente sobre la lengua del animal. |
| Enterosept (KUALKOS) | Cada 90 ml contiene: Furazolidona: 250 mg. Neomicina sulfato: 350mg. Metil bromuro de homatropina: 20mg. Pectina: 500 mg. Caolin: 15g. Subcarbonato de Bismuto: 5g. | Suspensión oral: Cada 6 horas. Caninos grandes 10 ml, medianos 5 a 7ml, pequeños y felinos 3 a 5 ml. | Antidiarreico- antibacteriano. Tratamiento de diarreas de diversa etiología o no específicas. Gastroenteritis tóxicas, infecciosa y parasitarias. |

PREVENCIÓN Y CONTROL

La mayor parte de los estudios del tratamiento contra Giardiasis se basan en la eliminación de los quistes fecales y no en la remoción de los organismos intestinales. Es factible que estos compuestos no eliminen los parásitos, sino que inhiban la producción de quistes durante un cierto período de tiempo. Por ello, se desconoce si los animales tratados siguen siendo una fuente de infección futura (Contreras, 2004).

Además, dichos animales también pueden ser una fuente de infección, debido a los quistes viables que pueden existir en el material fecal adherido a su pelaje y además presentes en el medio, si éste es frío y húmedo. Estos factores son de particular importancia para el control de la infección en un criadero (Cañete *et al.*, 2004). El sistema de control recomendado para tales efectos se basa en: medidas de control del medio ambiente, uso de nuevas terapias para tratar animales, eliminación de los quistes presentes en el pelaje y prevención de la reintroducción del organismo.

Se debe de considerar:

- Establecer una zona limpia para movilizar a los animales durante la limpieza y tratarlos con Febendazol por 5 días consecutivos.
- Remover TODA la materia fecal.
- Realizar limpieza con compuestos de amonio cuaternario.
- Dejar secar las áreas, de ser posible, por varios días (el quiste es sensible a la desecación)

- Bañar los animales para eliminar materia fecal del pelaje, antes de ingresar a zona limpia.
- Aplicar amonio cuaternario, en zona perianal, dejando actuar por 3 a 5 minutos, luego enjuagar y dejar secar.
- Volver a tratar con febendazol , por otros 5 días.
- Animales nuevos: tratar y bañar antes de ingresar al área limpia, aun cuando sus heces sean negativas.
- Usar pediluvios de amonio cuaternario, o un cubre-calzado para evitar reingreso del parásito.
- Hacer controles fecales periódicos. (Contreras, 2004)

Los quistes de giardia son muy poco resistentes a la desecación. Por el contrario, con buenas condiciones ambientales de temperatura y humedad pueden sobrevivir más de dos meses. A 8 °C resisten por un periodo de 77 días, mientras que a 21 °C su periodo de persistencia es de 5–24 días y a 37 °C, en agua destilada, 4 días. Por otra parte el agua a una temperatura de ebullición los destruye rápidamente al igual que las soluciones de fenol, amonio cuaternario, lisol (Cordero del Campillo *et al.*, 2002).

Los compuestos de yodo orgánico tales como las N-halominas, son estables en agua y demuestran marcada eficiencia para inactivar los quistes de giardia en dos minutos (Greene, 1993).



Figura 11. Desinfección del Área.



Figura 12. Baño para Eliminar
Materia Fecal del Pelaje.

XII. ZOONOSIS

Giardia spp es el parasito mas frecuente en los Estados Unidos de Norte América, los bebes y niños en guarderías son los mas susceptibles a la giardiasis. *Giardia* spp. No es tan específica de un huésped como se piensa. Los estudios epidemiológicos no indican que poseer una mascota constituye un factor de riesgo importante para la giardiasis en personas, no obstante resulta prudente tratar a los animales afectados por giardia, mientras permanezca la duda (Greene, 1993). La transmisión a partir de la exposición a quistes del parásito provenientes de fuente animal ha sido reportada, a pesar de reconocerse como una vía no común de adquisición de la infección (Cañete *et al.*, 2004).

En países en vías en desarrollo, *G. lamblia* afecta entre un 20 a un 30% de la población, siendo los niños menores de 5 años los mas afectados debido a su hábito deplorable de higiene. (Cañete *et al.*, 2004).

En los países desarrollados, el parásito es frecuente en guarderías. Sin embargo, se reporta también en nadadores, campistas, homosexuales, viajeros internacionales a áreas endémicas y personas que viven en condiciones de hacinamiento, refugiados de ancianos en instituciones para la tercera edad e individuos con trastornos mentales recluidos en sanatorios. Este parásito es además la principal causa de brotes de transmisión hídrica en estos países. Se estima que los portadores sanos de quistes representan el 15% de la población adulta y hasta el 50% de la población infantil y que estos son los mayores responsables de la diseminación de la infección en el hogar y a escala comunitaria (Alcaraz, 2002).

La adquisición del parásito requiere la ingestión de los quistes, lo cual está relacionado con la ingestión de aguas y alimentos contaminados; aunque cada vez se reporta con más frecuencia la transmisión de persona a persona. Experimentalmente se ha desarrollado la infección con la ingestión de 10 quistes del parásito, pero diferentes autores refieren que uno sólo es suficiente para desencadenar el proceso infeccioso (Cañete *et al.*, 2004).

La hipoacidéz, la gastrectomía, la pancreatitis crónica, así como las dietas ricas en carbohidratos, hierro y colesterol, constituyen factores predisponentes a la infección. Los niños menores de 5 años, los homosexuales, los viajeros internacionales, los individuos en instituciones cerradas y posiblemente los inmunodeprimidos tienen una probabilidad especialmente elevada a adquirir la parasitosis (Cañete *et al.*, 2004).

XIII. MATERIAL Y MÉTODOS

El criadero ENERGY DOG de la ciudad Juárez nuevo león México se encuentra ubicado dentro del área metropolitana al sur-este de monterrey. Dentro del criadero ENERGY DOG se procedió a recolectar 40 muestras de heces fecales de caninos sin distinción de raza, sexo o edad. Ya que en este se dedican a la crianza de pastor alemán y pastor belga mallinois y son de diversas edades.

Para la toma de estas muestras se necesito la colaboración de 2 compañeros de la universidad autónoma agraria Antonio narro U. L. cuales nombres son Juan Raymundo Ponce García y Víctor Edel Segovia Beltrán. Ellos sujetaban los caninos adultos con la pértiga y el otro lo sujetaba del tren posterior, mientras tanto su servidor ya estaba preparado con guantes de látex, esto para no contaminar la muestra y protección personal así duramos 2 días en la recolección de estas muestras donde introducía un hisopo por el ano para tomar la muestra directamente del recto del animal. Después de tomadas las muestras se colocaron en un recipiente cerrado con gel refrigerante esto para evitar que los resultados nos dieran falsos negativos y estas fueron llevadas al laboratorio de la universidad autónoma agraria Antonio narro unidad laguna de inmediato para evitar este tipo de errores

Procedimiento para el cual se ocupó el siguiente material.

Material utilizado para la recolección de muestras:

- 35 pares de guantes estériles de látex para la recolección rectal

de las heces fecales.

- 35 tubos de ensaye.
- 35 etiquetas para la identificación las muestras dentro del tubo de ensaye.
- 35 hisopos.
- Gel refrigerante
- Hielera de nieve seca

Para la evaluación de las muestras se utilizó:

Material para la evaluación de muestras:

- Microscopio.
- Solución de Willis (solución sobresaturada de cloruro de sodio o sal común).
- Lugol al 5%.
- Agua destilada.
- Mortero con mazo.
- Coladores.
- Gasas.
- Tubos de ensaye.
- Centrifuga.
- Vasos de presididos.
- Pipeta de pasteur.

- 40 portaobjetos.
- 40 cubreobjetos.
- Guantes de látex estériles.

Procedimiento:

Se maceran 2 gramos de heces con 15 ml de agua destilada dentro del mortero.

- Tamizar la solución a través de gasas y un colador.
- Verter la solución filtrada en un tubo de centrifuga.
- Colocar el tubo en la centrífuga y centrifugué a 1500 RPM durante 5 minutos.
- Retirar el agua destilada y agregué la solución sobresaturada de cloruro de sodio (solución de Willis) al material sedimentado.
- Colocar el tubo en la centrifuga y centrifugué a 1500 RPM durante 5 minutos.
- Tomar una gota del sobrenadante con la pipeta de Pasteur.
- Colocar la gota en un portaobjetos.
- Añadir una gota de Lugol.
- Colocar un cubreobjetos.
- Y observar al microscopio a 40 X y 100 X.

En esta técnica se dispersa una solución de material fecal en una solución de mayor densidad que los quistes del parásito. La diferencia en la gravedad específica hace que los quistes se eleven a la superficie. La mayor parte de las partículas fecales caen hacia el fondo, ya que su densidad es mayor que la de la solución. Los quistes se separan del material extraño y se concentran en una sola área.

XIV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la evaluación de las muestras de heces fecales recopiladas de 40 caninos diferentes se encontró que el 0% fueron positivos a *Giardia spp*, sin importar raza, sexo o edad.

Pienso que estos resultados se debieron al cambio drástico de clima dando como resultado la inhibición del ciclo de vida de la *Giardia*.

XV. DISCUSIÓN

Aún cuando los resultados de esta investigación fueron negativos esto no significa que los caninos de este criadero se encuentren libres de este parásito. Y aunque los animales que fueron ocupados para este propósito, no presentaban signos de la enfermedad, hay que recordar que este parásito puede no presentar signos o pasar desapercibido.

XVI. CONCLUSION

Se recomienda llevar acabo otro muestreo en el criadero ENERGY DOG de la ciudad Juárez nuevo león México durante otra apoca del año para que el clima no sea un factor que pueda alterar los resultados de las muestras, también tomar las muestras de heces de cada perro una cada tercer día durante nueve días de esta manera se eliminaría la posibilidad de que la muestra sea tomada durante un periodo de intermitencia donde los quistes no sean excretados aun cuando el perro este infectado.

Por otra parte se debe dar mayor importancia a los programas de desparasitación de perros tanto en casa como en criaderos, para evitar que el perro sea un factor predisponerte en la infección por giardia en humanos y cuidar la salud del perro como un integrante mas de cada familia.

XVII. LITERATURA CITADA

1. Aiello S., Mays A. 2000. El Manual Merck de Veterinaria. Editorial Océano Grupo Editorial S.A. 5ta Edición. Pág. 161-163.
2. Alcaraz Soriano María Jesús. 2002. Giardia y Giardiosis. Servicio de Microbiología. Control Calidad SEIMC. Pág. 1-9.
3. Aycachi Inga Rómulo. Abril 2004. Protozoos.
<http://www.monografias.com/trabajos31/protozoos/protozoos.shtml>
4. Barr C. Stephen y Bowman D. Dwight. 2004. Giardiasis. Compendium Continuing Education. Vol. 16. No. 5. Pág. 1-10
5. Bianciardi P., Papini R., Giuliani G., and Cardini G. 2004. Prevalence of Giardia antigen in stool samples from dogs and cats. Revue Méd. Vet. Vol. 155. Pág. 417-421.
6. Binda J. A., Moriena R. A., y Alvarez J. D. 2003. Comparación de la eficiencia de dos técnicas de diagnóstico de Giardiosis canina. Revista Veterinaria. Vol. 14. No. 2. Pág. 88-89.
7. Binda J. A., Moriena R. A., y Alvarez J. D. 2005. Giardiosis canina en la ciudad de Corrientes y zonas aledañas. Cátedra Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Pág. 1-3.
8. Boch Josef. 1982. Parasitología en Medicina Veterinaria. Editorial Hemisferio Sur S.A. Primera Edición. Pág. 389-390.
9. Bowman D. Dwight. 2004. Parasitología para Veterinarios. Editorial Elsevier. Octava Edición. Pág. 92-93.
10. Cañete Roberto, González María E., Almiral Pedro., y Figueroa

- Iglermis. 2004. Infección por Giardia y Giardiosis. Revista Panamericana de Infectología. Volumen 6. No. 3. Pág. 41-48.
11. Contreras Gustavo. 2004. Giardiasis. MEVEPA (www.mevepa.cl). Pág. 1-8. 05 de Noviembre del 2007.
12. Cordero del Campillo M., *et al.* 2001. Parasitología Veterinaria. Editorial McGraw-Hill Interamericana. Primera Edición. Pág. 517-521.
13. Cordero del Campillo M., *et al.* 2002. Parasitología Veterinaria. Editorial McGraw-Hill Interamericana. Segunda Edición. Pág. 620-623.
14. Greene Craig E. 1993. Enfermedades Infecciosas en Perros y Gatos. Editorial McGraw-Hill Interamericana. Primera Edición. Pág. 842-847.
15. Greene Craig E. 2000. Enfermedades Infecciosas en Perros y Gatos. Editorial McGraw-Hill Interamericana. Segunda Edición. Pág. 530-535.
16. Itoh Naoyuki, Muraoka Noboru, Saeki Hideharu, Auki Mikiko, and Itagaki Tadashi. 2005. Prevalence of *Giardia intestinalis* Infection in Dogs of Breeding Denles in Japan. Parasitology. J. Vet. Med. Sci. Vol. 67. No. 7. Pág. 717-718.
17. Mehlhorn H., y Raether W. 1994. Manual de Parasitología Veterinaria. Editorial GRASS-IATROS. Pág. 42-45.
18. Morgan R. 2004. Clínica de Pequeños Animales. Editorial Elsevier. Cuarta Edición. Pág. 1131-1132.
19. Olson Merle E., Hannigan Carl J., Gaviller Patricia F., y Fulton Libby A. 2001. The use of a Giardia vaccine as an immunotherapeutic agent in dogs. Can. Vet. J. Vol. 42. Pág. 865-868.
20. Pérez Corrales José Ascensión, Zaldivar Pulido Raquel, Gaxiola

- Camacho Soila Maribel, Rubio Robles Mario Cesar, y Renteria Gonzales Reyes. 1998. Eficacia del oxibendazol contra giardia canis en perros. Memorias XIX congreso nacional de la AMMVEPE. Pág. 93-96.
21. Quiroz H. 1999. Parasitología y Enfermedades Parasitarias de Animales Domésticos. Editorial Limusa. 8va. Edición. Pág. 67.
22. Soulsby E. J. L. 1987. Parasitología y enfermedades parasitarias en los animales domésticos. Editorial Interamericana. Primera Edición. Pág. 583-589.
23. Willard Michael D. 2005. Enfermedades Infecciosas que Afectan al Tracto Gastrointestinal. Virbac Salud Animal. No. 5. Pág. 1-5.
24. Zárate R. Daniel, Chávez V. Amanda. Casas A. Eva, y Falcon Néstor P. 2003. Prevalencia de giardia sp. En canes de los distritos del cono sur de Lima Metropolitana. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. Vol. 14. No. 2. Pág. 1-6.
25. Poloni Oyarzún Rodrigo Alfonso. 2006. Enfermedades Parasitarias. <http://www.monografias.com>

XVIII. REFERENCIA DE IMÁGENES

Figura 1. Trofozoitos.

<http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Analyser/GiardiaTrofozAM.jpg>

Figura 2. Quiste.

http://www.argjiro.net/albi/white/meded/images/giardia_cyst.jpg

Figura 3. Esquema de Trofozoíto de *Giardia spp.*

<http://www.tulane.edu/~wiser/protozoology/notes/intes.html>

Figura 4. Esquema de Quiste de *Giardia spp.*

<http://www.tulane.edu/~wiser/protozoology/notes/intes.html>

Figura 5. Trofozoíto Emergiendo de un Quiste.

<http://www.monografias.com/trabajos35/enfermedades-parasitarias/>

enfermedades-parasitarias.shtml

Figura 6. División Binaria de la *Giardia*.

<http://www.monografias.com/trabajos35/enfermedades-parasitarias/>

enfermedades-parasitarias.shtml

Figura 7. Ciclo de las *Giardias*.

<http://www.foyel.com/cartillas/imagenes/1115292796.jpg>

Figura 8. Kit de Diagnóstico de *Giardiasis*. Contreras Gustavo. 2004.

Giardiasis. MEVEPA (www.mevepa.cl). Pág. 1-8. 05 de Noviembre del 2007.

Figura 9. Forma Enquistada de *Giardia spp.* Evidenciados por

Inmunofluorecencia Directa. Barr C. Stephen y Bowman D. Dwight. 2004.

Giardiasis. Compendium Continuing Education. Vol. 16. No. 5. Pág. 1-10

Figura 10. Fotomicrografía Electrónica de Giardia spp. Adosadas a la Mucosa Intestinal. Contreras Gustavo. 2004. Giardiasis. MEVEPA (www.mevepa.cl). Pág. 1-8. 05 de Noviembre del 2007.

Figura 11. Desinfección del Área. Contreras Gustavo. 2004. Giardiasis. MEVEPA (www.mevepa.cl). Pág. 1-8. 05 de Noviembre del 2007.

Figura 12. Baño para Eliminar Materia Fecal del Pelaje. Contreras Gustavo. 2004. Giardiasis. MEVEPA (www.mevepa.cl). Pág. 1-8. 05 de Noviembre del 2007.