

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA**

DIVISION REGIONAL CIENCIA ANIMAL



MONOGRAFIA

**PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER
EL TITULO DE:**

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

“DIARREA VIRAL BOVINA”

TORREON, COAHUILA

SEPTIEMBRE DE 2011

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA**

DIVISION REGIONAL CIENCIA ANIMAL



MONOGRAFIA

“DIARREA VIRAL BOVINA”

**PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER
EL TITULO DE:**

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

PRESENTA

ARNULFO RODRIGUEZ SILVA

ASESOR:

**MVZ. RODRIGO I. SIMÓN ALONSO
TORREON COAHUILA SEPTIEMBRE DE 2011**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA**


DIVISION REGIONAL CIENCIA ANIMAL

MONOGRAFIA

“DIARREA VIRAL BOVINA”


APROBADO POR EL COMITÉ

PRESIDENTE DEL JURADO



MVZ. RODRIGO I. SIMÓN ALONSO

**COORDINADOR DE LA DIVISION REGIONAL DE
CIENCIA ANIMAL**



MVZ. RODRIGO I. SIMÓN ALONSO



Coordinador de la División
Regional de Ciencia Animal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA

DIVISION REGIONAL CIENCIA ANIMAL


"DIARREA VIRAL BOVINA"


MONOGRAFIA

POR
ARNULFO RODRIGUEZ SILVA


PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TITULO
DE:

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA



MVZ. RODRIGO I. SIMON ALONSO
PRESIDENTE


M.C. JOSE DE JESÚS QUEZADA AGUIRRE

VOCAL


I.Z. JORGE H. BORUNDA RAMOS

VOCAL


MVZ. CUAUHTEMOC FELIX ZORRILLA

VOCAL SUPLENTE

Dedicatoria

A dios, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para terminar este trabajo.

A mis padres, J. Cruz y Aurora, que me brindaron su amor, su cariño, su estímulo, su comprensión, su paciencia y su apoyo constante, quienes me enseñaron desde pequeño a luchar para alcanzar mis metas. Mi triunfo es el de ustedes, ¡los amo!

A mis hermanos: Martha, Heber, Ricardo, Jr., Lupe, que siempre creyeron en mí y saben que los quiero.

A mi novia, Yazmín que siempre me apoyo y me empujo en mi carrera y nunca dudo en que terminaría mis estudios y es la persona a la cual amo mucho.

A los que nunca dudaron que lograría mi triunfo. Mis abuelitos Chalio y mi mama cuquita que siempre me apoyaron.

A mis tíos: Arnulfo Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez (QEPD) que se que también me hubiese apoyado, Layo lozano, chayo lozano, lety lozano, sanjuana Rodríguez, que me brindaron su cariño y apoyo en cualquiera de mis situaciones que siempre estuvieron empujándome y animándome a terminar este trabajo que hoy culmina.

A mis primos: Niké, Norma, Chelito, Dina, Juanito, Nohemí, que me aguantaron todo este tiempo.

A mis amigos: flama, Rikí, Mario G, Arturín, chompíras, Nery, Conrrado, Laura C, Yesica, claudia, Cítlalí, que siempre me escucharon y me apoyaron en cada etapa de mi carrera.

A mis maestros: Rodrigo I. Simón, que me apoyo con mi monografía, Chino Liu que siempre me apoyo en mi carrera.

Agradecimientos

Doy gracias a Dios

Por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el período de estudio.

Gracias, es una palabra tan pequeña pero con un gran significado....

Siempre he querido plasmar mis pensamientos en un papel.

Siempre pensare lo importante que es para mí escribir una carta de agradecimiento a las personas que realmente importan, tarea que siempre tengo presente.

A mis padres J. Cruz Rodríguez Briones y Aurora Silva, gracias por su apoyo, su amor y comprensión que me han dado.

A mis hermanos: Martha, Heber, Ricardo, Lupe, Jr.

A mi novia: Yazmín, por su apoyo, comprensión y por aguantarme todo este tiempo.

*A mis amigos: por sus preciados consejos y gratos momentos.
Por vuestro generoso apoyo.*

Siempre estaré en deuda...

Jamás voy a olvidarlos

GRACIAS!!!!!!!

Índice

Dedicatoria.....	I
Agradecimientos.....	II
Título.....	IV
Resumen.....	IV
Introducción.....	1
Antecedentes históricos.....	2
Diarrea viral bovina.....	4
Etiología.....	5
Taxonomía y estructura.....	5
Variabilidad.....	5
Clasificación.....	6
Genotipificación.....	7
Epidemiología.....	7
Manifestaciones clínicas y patogenia.....	10
Diagnóstico.....	16
Erradicación.....	23
Conclusiones.....	25
Bibliografía.....	26

Titulo. **DIARREA VIRAL BOVINA**

Resumen

El agente de DVB fue descrita en 1940 en Saskatchewan, Canadá. Asociada a una enfermedad aguda y a menudo fatal caracterizada por diarrea y lesiones erosivas del tracto digestivo. Actualmente se reconoce que tiene una distribución mundial con una prevalencia que fluctúa entre 50% y 90%.

El virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agente causal del complejo diarrea viral bovina (DVB)/ enfermedad de las mucosas (EM), es responsable de la ocurrencia de diferentes cuadros clínicos, de variable intensidad y gravedad. El carácter inmunodepresor del virus predispone al animal a otras enfermedades causadas por agentes comensales y/o patógenos.

Especial importancia adquiere esta virosis cuando la infección ocurre en la etapa reproductiva, ya que puede interferir con la concepción y la infección transplacentaria dependiendo de la edad de gestación y de las características biológicas de la cepa viral, puede producir muerte embrionaria o fetal, aborto, momificación, malformaciones congénitas, mortalidad perinatal, retraso en el desarrollo, respuesta inmune protectora o reconocimiento del virus como propio sin capacidad de responder inmunológicamente a él y en este caso, si el animal sobrevive, queda con una infección persistente comportándose en vida extrauterina como portador inmunotolerante al virus y expuesto a cursar la EM que es siempre de curso fetal.

El vDVB es un pestivirus de la familia flaviviridae. Se describe un solo serotipo con variantes antigénicas y dos tipos definidos por su capacidad de producir efecto citopático in vitro. El biotipo no citopatógeno (NCP), que es el que frecuentemente se aísla desde el síndrome DVB, es considerado el biotipo predominante, y el biotipo citopatógeno (CP) que se aísla, mayoritariamente,

desde animales que sufren la EM, pero últimamente también se ha aislado desde cuadros de DVB aguda.

El diagnóstico, de infección por el VDVB, se basa en la identificación de antígenos virales, directamente en tejidos infectados o en aislados realizados en cultivos celulares, siendo estos dos procedimientos de mayor significancia que la medición de la respuesta inmune.

Palabras clave. Diarrea viral bovina, edad, inmunológico, gestación, citopático, no citopático.

Palabras clave: Diarrea Viral Bovina, Inmunológico, Gestación, Citopático, No Citopático.

INTRODUCCION

La ganadería de nuestro país ha mostrado una evolución muy marcada en nivel de su productividad, tanto en ganado productor de leche como en ganado productor de carne y ganado de doble propósito, dicha productividad puede verse afectada por diversos problemas ligados a condiciones también muy diversas:

- alimentación (incluye suplementación de minerales y vitaminas)
- genética
- manejo
- instalaciones

Dentro de cada uno de estos aspectos, son muy diversos las situaciones que pueden involucrar la productividad de los hatos tales como:

Alimentación.- condiciones de los insumos, contaminación mal estado de los alimentos, deficiente orden de mezclado de la ración (ganadería lechera de alta tecnificación) alimentos sin nutrientes y muy fibrosos (agostadero, sobre todo en época de estío) o bien alimentos demasiados molidos y mezclas en las que no se cuida la relación carbohidratos-fibra-proteína (engordas intensivas y ganado lechero en etapa de recría).

Instalaciones.- las condiciones deficientes generan estrés en los animales, lo más común suele ser, falta de sombras adecuadas y suficientes, pisos sucios y con desniveles, piedras, comederos deficientes e insuficientes, falta de áreas adecuadas de manejo etc., etc.

Manejo.- las condiciones deficientes de manejo suelen ser comunes, no existen en la mayoría de las explotaciones un sentimiento de respeto hacia los animales y esto genera con mucha regularidad estados de estrés que complican la eficiencia del aparato inmunocompetente.

Genética.- los grupos de animales han evolucionado considerablemente en sus niveles de productividad, estando esto ligado a programas de mejoramiento

genético, lo que ha llevado a los hatos a pasar, en el caso de hatos lecheros a promedios de producción por ciclo de la lactación de 4000 kg en los 70s a casi 9000 kg a fines de los 90s, y en caso de ganado productor de carne o doble propósito, hatos en los que se observa en todas las áreas ganaderas, cada vez mas animales de rápido y eficiente crecimiento con mejores conversiones alimenticias.

Programa de medicina preventiva.- las condiciones anteriores pueden influenciar en mayor o menor proporción a la salud de los animales, por lo tanto deberán mantener programas de medicina preventiva para los cuales se deberá tomar ciertas consideraciones; estos deberán ir siempre ligados a un buen estado nutricional, en donde deberemos considerar el uso de suplementos minerales y vitamínicos que estimulen la respuesta inmune para garantizar que las vacunas tengan un afecto óptimo; otra necesidad es el conocimiento epidemiológico de las zonas basadas en análisis de seroprevalencia con la cual conoceremos el nivel de infección de las enfermedades involucradas en la cría y explotación de ganado, las cuales han tenido amplia difusión por el desconocimiento “ epidemiológico “

Así como el uso de biológicos inadecuados por lo general pobres en niveles de inmunogenicidad.

También debemos de considerar que muchas veces no se realizan estos procedimientos de toma y envíos de muestra.

Dentro de las enfermedades de gran importancia, actualmente se describe a la diarrea viral bovina, la cual se presenta clínicamente con diversidad de presentaciones clínicas y a la cual se le reconoce como el padecimiento. Que tiene que ver prácticamente con gran parte de los padecimientos de los hatos bovinos.

Antecedentes históricos.

En 1940 fue descrita en Saskatchewan, Canadá, una enfermedad en bovinos caracterizada por una severa diarrea, depresión, anorexia, leucopenia y ulceración de las mucosas de la cavidad bucal que fue llamada “enfermedad

X “por la dificultad de la identificación del agente causal y fallas en el intento de reproducirla experimentalmente. Un síndrome de similares de características clínicas histopatológicas fue descrita posteriormente en new york, EEUU y se le denominó diarrea viral bovina (DVB)⁴.

En 1950 se presentaron casos más severos en iowa, EEUU, caracterizados por descarga nasal mucopurulenta, hemorragias y erosiones en el tracto intestinal con mínima infiltración de células inflamatorias; sin embargo, los animales inoculados con sangre y machacados de tejidos de animales solo presentaban fiebre ligera y fue denominada enfermedad de las mucosas (EM)⁴.

El virus de la DVB (VDBV) fue aislado en 1957 en cultivos celulares de un caso de EM. El virus aislado, una cepa citopática (cp.) Producía cambios morfológicos en los cultivos celulares. Los intentos de reproducir experimentalmente la EM con el virus aislado fueron infructuosos. Casi al mismo tiempo, se aisló un virus que no inducía cambios morfológicos en los cultivos celulares de caso crónico de EM (una cepa no citopático), sin que se llegaran a relacionar las cepas del virus cp y ncp. En la actualidad, los fenotipos cp y ncp de las cepas se les reconocen como biotipos y se refiere únicamente a la presencia o ausencia de cambios morfológicos que se inducen en cultivos celulares⁷.

Gilliespie y de mas en 1960 aislaron en cultivos celulares una cepa cp de un bovino con DVB en Oregon. Este virus fue denominad Oregon C24V, presente hasta hoy como una de las cepas de referencia descrita ampliamente en la literatura la misma que luego del pasaje 32 en cultivos celulares fue incapaz de inducir signos clínicos en un animal inoculado pero tenía la capacidad de inducir anticuerpos contra el virus. Con esta cepa atenuada, a virus vivo, se fabrico la primera vacuna comercial contra la DVB que fue utilizada ampliamente para el control de la enfermedad; sin embargo, surgieron efectos post vacúnales como fallas reproductivas, defectos congénitos y hasta casos de EM¹⁵.

Diarrea viral bovina.-

Se le define como un complejo de enfermedades asociadas a la infección por el virus de la diarrea viral bovina (vDVB), se puede presentar en otras especies tales como: ovinos, caprinos y cerdos en forma asintomática generalmente.

El vDVB, es altamente mutable, es una partícula viral del género pestivirus.

Los pestivirus han sido reclasificados de la familia togaviridae a la familia flaviviridae.

El vDVB se presenta como dos biotipos: citopático y no citopático, basado en su desarrollo en cultivo celular y en al menos dos genotipos, tipo 1 y tipo 2, basado en la secuencia geográfica; ningún biotipo ni genotipo tiene consistencia, no directamente relacionado a virulencia¹.

En general los pestivirus tienen muy limitada habilidad para mantener su infectividad fuera del huésped. El vDVB pierde rápidamente su infectividad al contacto con solventes orgánicos y pH ambientales de 5.7 a 9.3. Su sensibilidad al bajo pH aumenta con variaciones de temperatura de entre 4 y 37 grados centígrados. Los dos biotipos son igualmente sensibles a temperatura y pH. Otros pestivirus son rápidamente inactivados por calor y desecamiento, luz ultravioleta, detergentes y solventes orgánicos¹.

La diarrea viral bovina es una enfermedad de distribución mundial y endémica en la mayoría de las poblaciones bovinas. Es responsable de ocasionar un amplio rango de manifestaciones clínicas y lesiones siendo los trastornos reproductivos los de mayor impacto económico. Las estrategias de erradicación dependen de la situación epidemiológica regional; básicamente consisten en la identificación y eliminación de bovinos persistentemente infectados, principal fuente de infección y reservorio del virus¹.

ETIOLOGÍA

Taxonomía y estructura. El virus de la diarrea viral bovina (vDVB) pertenece al género pestivirus de la familia flaviviridae¹⁹. Son virus envueltos, esférico y miden 40 a 60 nm de diámetro. Se componen de una cadena simple de ARN compactado por una cápside proteica, rodeada por una membrana fosfolipídica con tres glicoproteínas ancladas en ella¹.

Variabilidad. La principal característica de este virus es su variabilidad genética y antigénica¹³. La característica principal de un virus ARN es su plasticidad y este se debe a la falta de una exonucleasa eficiente para corregir las bases mal incorporadas, ocasionando una sustitución de base de alta frecuencia (1 un error por cada 10.000 nucleótidos polimerizados). El vDVB usa esta estrategia para sobrevivir, originando cepas mutantes que escapan a la respuesta inmunológica del hospedador¹⁹. El cruce de especies crea tras oportunidad para la diversificación, ya sea por adaptación al nuevo hospedador o por evolución divergente. Sin embargo, el virus de DVB aislado de cerdos y ovejas tiene características biológicas y antigénicas similares a los aislados del bovino¹⁹.

Otra posible causa para la variabilidad es la oportunidad para la mutación que ofrecen los prolongados periodos de replicación en animales persistentemente infectados. Sin embargo, esta última posibilidad no parece suceder con el vDVB. Bolin y Ridpath demostraron que nuevas variantes antigénicas se originan durante el pasaje del virus en bovinos susceptibles que desarrollan una infección aguda. Esto sugiere que, mientras los animales persistentemente son más importantes como reservorios, los animales con infección aguda pueden ser más importantes para la generación de nuevas espectro de manifestaciones clínicas y lesiones, dificultando además, su diagnóstico y limitado el espectro de manifestaciones clínicas y lesiones, dificultando además, su diagnóstico y limitando el espectro de protección brindada por el empleo de vacunas monovalentes²².

Clasificación

La clasificación de vDVB es difícil, debido a su variabilidad genética y antigénica y a su estrecha relación con otros miembros del género Pestivirus (virus de la peste porcina clásica y virus de la enfermedad de la frontera del ovino). Los hospedadores en los que eran aislados los pestivirus fueron las bases iniciadas para su subdivisión. Así, los pestivirus que eran aislados del cerdo, ovino y bovino se los clasificaba como virus de la peste porcina clásica, virus de la enfermedad de la frontera y vDVB, respectivamente. Sin embargo, este criterio de clasificación es poco fiable debido a que los pestivirus cruzan fácilmente la barrera de especie¹.

Según sus efectos en los cultivos celulares, los pestivirus se dividen en biotipos citopáticos (CP) y no citopáticos (NCP). Los virus CP ocasionan vacuolización y muerte celular, los virus NCP no ocasionan cambios visibles en el cultivo celular y la célula infectada parece normal. Esto no implica que los biotipos NCP sean no patogénicos. Por el contrario, es el biotipo predominante en la naturaleza, aislado de la mayoría de las formas clínicas y el único capaz de originar infección persistente. El biotipo CP se aísla únicamente de animales con enfermedad mucosa y se origina por mutación a partir del biotipo NCP; ya sea por deleción de fragmentos del genoma viral, inserción de fragmentos de ARN celular o duplicación y reordenamiento del ARN viral¹.

Hay considerable variaciones en la virulencia de las distintas cepas aisladas del vDVB, las infecciones pueden ser inaparentes o tener un desenlace fatal. Sin embargo, no se han identificado marcadores de virulencia que permitan un sistema de clasificación de las cepas de campo en base a su patogenicidad. También, han sido infructuosos los intentos de correlacionar los signos clínicos con la agrupación filogenética de las distintas cepas aisladas⁴.

No sea podido establecer una serotipificación del vDVB. Estudios de neutralización cruzada entre distintos virus DVB demuestran que pertenecen a un grupo serológicamente relacionado, dentro del cual hay un espectro antigénico con reacción cruzada, sin suficientes diferencias antigénicas para

clasificarlos en serotipos. El empleo de anticuerpos monoclonales discierne diferencias antigénicas sutiles y permiten clasificar a los Pestivirus en 4 grupos: virus de la peste porcina clásica, virus de la enfermedad de la frontera del ovino, Genotipo 1 y Genotipo 2 del vDVB. Sin embargo algunos virus aislados de jirafas, ciervos, ovinos y bovinos no han podido ser tipificados satisfactoriamente; ellos pueden representar variantes de algunos de los 4 grupos principales o ser grupos adicionales⁴.

Genotipificación

Es el método aceptado para clasificar a los pestivirus. Bajo este sistema de clasificación el vDVB se agrupa en 2 genotipos: genotipo 1 y genotipo 2 del virus de la diarrea viral bovina 60. El genotipo 1 del VDVB puede ser dividido en al menos 11 genogrupos y es muy probable que nuevos genogrupos sean revelados en futuros análisis³⁵.

Recientemente se han identificado ambos genotipos. Esto tiene gran implicancia en el diagnóstico y control debido a que a las cepas empleadas en los laboratorios para la elaboración de vacunas y reactivos de diagnósticos puede no ser capaces de abarcar el espectro antigénico y genético de los aislados del campo. Por lo tanto, es necesaria una reevaluación de estas cepas de laboratorio³⁵.

Sin embargo, los estudios de Ronchi y Col. Indican que la respuesta inmune a los dos genotipos es parcialmente homóloga, ya que bovinos inmunizados, de manera natural o artificial, con VDVB del genotipo 1 están parcialmente protegidos contra el virus del genotipo 2³⁵.

EPIDEMIOLOGÍA

Prevalencia de la infección. Esta enfermedad tiene una distribución mundial y la infección tiende a ser endémica en la mayoría de las poblaciones

bovinas. La mayoría de las encuestas en los diferentes países alcanza niveles de 0,5 a 2% de bovinos persistentemente infectados (PI) y 60 a 80% de bovinos seropositivos³⁵.

Hospedador. Los pestivirus infectan naturalmente solo a los ungulados del Orden Artiodáctilo. Los pestivirus ruminantes infectan a porcinos, ovinos, caprinos, alpacas, llamas, camellos y búfalos de agua. Estas consideraciones deben tomarse en cuenta a la hora de implementar un programa de control, ya que los pestivirus cruzan la barrera de especie¹¹.

Fuente de infección. La principal fuente de infección y reservorio del virus en la naturaleza son los bovinos PI. Ellos eliminan continuamente durante toda su vida grandes cantidades del virus en secreción nasal, saliva, orina, materia fecal, lágrimas, semen y leche. Los animales con infección aguda también son fuente de infección; aunque menos eficiente, ya que eliminan el virus en cantidades más bajas y por cortos períodos³⁸.

Modos de transmisión. La transmisión puede ser vertical u horizontal, por contacto directo o indirecto.

Transmisión vertical. La infección transplacentaria ocurre en hembras susceptibles infectadas durante la preñez. Si el feto es infectado por biotipos NCP antes de adquirir competencia inmunológica (antes del día 125 de gestación, aproximadamente) desarrollara una infección persistente. Pese la elevada tasa de mortalidad de de los animales PI en su primer año de vida (más de 50%), muchos alcanzan la madurez sexual y se reproducen. Hembras PI siempre dan terneros PI. La transmisión vertical también ocurre luego de la transferencia embrionaria si el recipiente es PI, o la vaca donante es PI y no se realiza el correcto lavado del embrión.

Transmisión horizontal. El contacto directo con animales PI, especialmente contacto nariz-nariz, es el modo más eficiente de transmisión en condiciones naturales. El contacto directo con animales que cursan una infección aguda también puede transmitir el virus ^{30,32}.

Se ha demostrado experimentalmente la transmisión por vía aérea a corta distancia entre bovinos persistentemente infectados a bovinos centinelas. Aunque la transmisión aerógena no es la principal ruta de transmisión, puede tener consecuencias graves cuando cepas de alta virulencia afectan a poblaciones susceptibles y con alta densidad animal¹⁵.

El semen crudo o criopreservado de toros PI o con infección aguda es una importante vía de transmisión horizontal. Para evitar el uso de estos animales, en los centros de inseminación se debe recurrir al aislamiento viral y a un periodo de cuarentena que supere la fase aguda de la infección. Sin embargo, un toro con infección aguda puede escapar al aislamiento viral en sangre, superar el periodo de cuarentena y seguir siendo una amenaza¹⁰.

El virus pueda eliminarse en semen por un corto periodo más allá del último día de viremia y se han detectado toros fuertemente seropositivos no virémicos que eliminan persistentemente el virus por semen²⁶.

Esta última situación se presenta cuando la infección ocurre en la pubertad, durante la formación de la barrera inmunológica hemato-testicular, permitiendo al virus replicarse dentro del testículo y evadir la respuesta inmune. Por lo tanto, es esencial un examen del eyaculado antes que el semen sea distribuido²⁶.

También es posible la transmisión por transferencia embrionaria. La mayoría de las células del tracto reproductivo de la hembra son permisibles al virus; además, los cultivos celulares y el suero fetal bovino utilizados en transferencia embrionaria pueden estar contaminados.

Transmisión entre rebaños. La principal forma de introducir el virus a un rebaño susceptible es atreves de la adquisición de bovinos PI o hembras que transportan fetos PI. Otras vías de introducción son: el uso de vacunas vivas, semen contaminado, cohabitación con ovinos, transferencia embrionaria y el contacto con bovinos con infección aguda^{31, 33}.

Transmisión dentro del rebaño. La tasa de transmisión dentro del rebaño depende de la forma de introducción del virus al mismo. Cuando un animal PI es introducido a un rebaño, la transmisión a animales susceptibles ocurre rápidamente a la mayoría de los animales del rebaño. Por el contrario, cuando la infección se inicia por un bovino con infección aguda o por alguna otra vía que inicie una infección aguda, la transmisión es de corta duración y solo incluye un pequeño porcentaje del rebaño antes que la transmisión cese. El sistema de producción y la virulencia de la cepa también participan en la tasa de transmisión. La diseminación es más eficiente en sistema de producción que permiten un estrecho contacto entre animales y con cepas virulentas^{20, 31, 33}.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y PATOGENIA

Si este animal PI (con una cepa no citopática) se infecta en los primeros 6 a 9 meses de vida con una cepa citopática se presenta la enfermedad de las mucosas, la cual tiene como manifestación clínica; diarrea, úlceras en todo el tracto digestivo y presenta una alta mortalidad. La enfermedad de las mucosas se divide en cuadros agudos ocasionados por cepas homologas y cuadros crónicos por cepas heterologas¹¹.

Algunos animales PI llegan a etapas reproductivas, presentando retraso en el crecimiento, problemas reproductivos y pueden quedar gestantes y parir, dando crías PI. Dentro de estos problemas reproductivos en estudios recientes se ha comprobado que el virus afecta a los ovarios (hipoplasia ovárica) de los PI, presentando menor número de folículos que llegan a terciarios y de Graf, dando folículos anovulatorios¹¹.

Pero lo más importante es que un animal PI elimina hasta 300 veces más virus por las mucosas, siendo nuestro mayor diseminador de DVB para nuestro hato. Estos animales pueden representar de 1 a 3% de un hato y típicamente ser encontrados en los grupos de vaquillas¹¹.

El diagnóstico de animales PI se puede realizar por medio de pruebas de ELISA captura de antígeno o aislamiento del virus.

La enfermedad de las mucosas requiere una infección persistente congénita con virus de biotipo ncp y una subsecuente súper infección con virus cp.

En bovinos de la EM se genera cuando animales PI con una cepa NCP son superinfectados con una cepa CP de origen exógeno o generada de cambios genéticos o recombinación del ARN de las cepas NCP residentes principalmente por inserción de secuencias celulares, esto suele ocurrir entre los 6 a 24 meses de edad¹¹.

El VDVB es responsable de originar un amplio rango de manifestaciones clínicas y lesiones como resultado de la interacción de factores tales como: cepa y biotipo viral, edad y estado inmune del hospedador, respuesta inmune inducida, factores estresantes y otros patógenos concurrentes.

Diarrea viral bovina aguda. Es una infección post natal aguda, de severidad variable, en bovinos seronegativos e inmunocompetentes^{2,4}.

Infección subclínica. La mayoría de las infecciones son subclínicas o de carácter moderado, con fiebre, descarga oculonasal, leucopenia transitoria, elevada morbilidad y baja mortalidad^{2,4}. Se desarrollan anticuerpos neutralizantes 14 a 28 días postinfección y consecuentemente la protección contra reinfecciones por cepas homologas del virus es de por vida².

Complejo diarrea neonatal bovina. Cuando fracasa la transferencia pasiva de anticuerpos, el virus participa en el complejo diarrea neonatal de los terneros. Infecciones concurrentes con enteropatógenos resultan en manifestaciones clínicas más severas, debido al efecto inmunodepresivo del vDVB o simplemente a una sumatoria de efectos¹⁸.

Infección aguda severa. Inicialmente se presentaba poco interés a las infecciones agudas, dada su baja mortalidad. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los informes de infección aguda severa de elevada morbilidad y mortalidad, asociada con virus de alta patogenicidad, caracterizada por fiebre elevada, signos respiratorios, diarrea, tormenta de abortos, caída en la producción de leche y muerte súbita^{20, 4}. En otros casos, la exposición a cepas de alta virulencia ocasiona una enfermedad con signos clínicos y lesiones anatomopatológicas similares a la forma de enfermedad de la mucosa¹⁵.

Inmunodepresión. El vDVB ocasiona leucopenia y altera las funciones de los leucocitos, aumentando la patogenicidad de microorganismos coinfectantes. Tiene una fuerte afinidad por el tejido linforreticular, ocasionando necrosis y atrofia de dichos tejidos². En el tejido linfoide el virus se localiza principalmente en las células del estroma, incluyendo macrófagos y células de soporte. Estas células elaboran citoquinas esenciales para el normal desarrollo y maduración de linfocitos, lo que sugiere que la necrosis linfoide es secundaria al trastorno del microambiente que proveen las células intersticiales y no a la acción directa del virus sobre los linfocitos¹⁰.

Enfermedades respiratorias. El vDVB origina inmunodepresión sistemática y pulmonar, aumentando la patogenicidad de los restantes agentes respiratorios^{10, 30}. Además, se ha demostrado que ciertos virus de la diarrea viral bovina actúan como agentes primarios de neumonías^{3, 21}.

Trastornos reproductivos. El mayor impacto económico de la infección con el vDVB es el ocasionado por los trastornos reproductivos^{21, 9}. Los efectos de la infección antes y durante la gestación se discuten en orden cronológico.

La infección aguda altera la función ovárica y reduce la fertilidad. El vDVB causa ooforitis intersticial no purulenta, con necrosis de células de las granulosa y de oocitos. Es posible detectar el antígeno viral en los macrófagos y células del estroma ovárico, entre los días 6 a 60 post infección y en células foliculares y oocitos en distintos estados de maduración²⁴. Además, las infecciones agudas ocasionan un retraso en el desarrollo de los folículos

pre-ovulatorios durante dos ciclos estrales consecutivos³², reducción de los niveles de estradiol durante la fase folicular y disminución o ausencia de las oleadas de hormona luteinizante pre-ovulatoria o retraso en el tiempo del pico de hormona luteinizante pre-ovulatoria²⁵.

No está claro de qué manera el vDVB altera la función ovárica, aunque es posible que actúe por uno o por más de los siguientes mecanismos: 1) inadecuado soporte gonadotrófico por infección de la glándula pituitaria; 2) la leucopenia que acompaña a la infección aguda puede ser el reflejo de una deficiencia en la población de leucocitos ováricos, células vitales para la dinámica folicular normal; 3) la necrosis de las células de la granulosa de los folículos pre-ovulatorios, afecta negativamente la secreción de estradiol y, consecuentemente, suprime la liberación de hormona luteinizante y retrasa y impide la ovulación^{7, 4}. La disfunción ovárica puede ser el resultado de la ooforitis y de los cambios en la concentración de citoquinas ováricas^{32, 5}. La reducción de los niveles de estradiol durante la fase folicular puede perjudicar el comportamiento estral, impedir la ovulación o reducir el número y calidad de oocitos liberados²⁵.

El impacto del vDVB durante la preñez se divide en cuatro periodos, en base a las manifestaciones clínicas de la infección durante estos intervalos de tiempo específicos¹.

Etapa embrionaria (0-45 días): las infecciones de hembras susceptibles próximas al momento de apareamiento ocasiona muerte embrionaria y repeticiones de servicio hasta que desarrollen respuesta inmune. Se desconoce como los biotipos NCP afectan al embrión¹.

El virus no tiene efecto sobre el crecimiento y desarrollo de los embriones hasta el día 8-9, momento en que pierden la zona pelúcida y se vuelven susceptibles. El resultado de la infección puede ser citolítica o no. Ambos terminan en muerte embrionaria, aunque la infección no citolítica también puede causar daño cromosómico, resultando en el desarrollo de malformaciones. Por otra parte, la replicación del virus en células oviductales

puede alterar sus funciones biológicas, como la secreción de factores embriotrópicos que soportan el desarrollo embrionario¹⁶.

Día 45 a 125 de gestación: este periodo comienza al finalizar la etapa embrionaria y culmina cuando el feto adquiere competencia inmunológica al vDVB. El momento exacto en que el feto adquiere competencia inmunológica al virus no es claro; se han detectado anticuerpos neutralizantes contra el virus en fetos infectados entre los días 100 y 135 de gestación. La infección con biotipos NCP antes que el feto adquiera competencia inmunológica, resulta en el nacimiento de animales persistentemente infectados e inmunotolerantes. Durante este periodo también se produce muerte fetal con momificación o aborto meses después y un pequeño porcentaje de teratogénesis^{21, 29}.

Día 125 a 175 de gestación: este periodo representa el comienzo de la inmunocompetencia fetal y del estado de organogénesis, momento en el cual se presenta un gran porcentaje de alteraciones del desarrollo. También se pueden producir abortos, pero estos son más frecuentes en las etapas tempranas de gestación. Se pueden observar distintos tipos y grados de malformaciones tales como hipoplasia cerebelar, microencefalia, hipomielogénesis, hidrocefalia, atrofia o hipoplasia del timo, cataratas, microftalmia, degeneración de retina, hipoplasia y neuritis del nervio óptico, alopecia, hipotricosis, hipoplasia pulmonar, retraso general del crecimiento y deformidades esqueléticas^{21, 29}.

Posibles explicaciones de esta malformación serían el daño celular directo por el virus o la destrucción de las células infectadas por el sistema inmune fetal. Los fetos ovinos infectados con el virus de la enfermedad de la frontera desarrollan hipotiroidismo y los bajos niveles de hormonas tiroideas afectan la concentración de la enzima 2', 3' – nucleótido cíclico – 3'-fosfodiesterasa, esencial para la mielinización y el normal desarrollo del sistema esquelético. Se desconoce si el vDVB induce fetopatías por un mecanismo semejante²¹. La inmunohistoquímica reveló abundante cantidad de antígeno en glándula pituitaria, hipotálamo y tiroides de un ternero infectado in útero con trastornos severos y generalizados de la osteogénesis. Este hallazgo

sugiere que el virus altera el metabolismo hormonal fetal originando trastornos del desarrollo esquelético¹⁴.

175 días de gestación en adelante: En esta etapa el feto se encuentra en un periodo de crecimiento general y es inmunológicamente competente. Las infecciones en este periodo resultan en el nacimiento de terneros seropositivos normales o débiles; mientras que en los abortos son ocasionales²¹.

Infección persistente. Un animal persistente infectado es aquel en que es posible aislar el virus de la sangre o tejidos en dos ocasiones sucesivas con un intervalo no menor a dos semanas. Estos animales son virémicos durante toda su vida y no producen anticuerpos contra la cepa que les origina inmunotolerancia. La infección persistente debe ser considerada en todo ternero pequeño al nacimiento, con escaso desarrollo y ganancia de peso, débil y con cuadros recurrentes de enfermedad respiratoria y digestiva. Otros son clínicamente normales, siendo indispensable el laboratorio para su diagnóstico^{1, 17}.

Enfermedad mucosa. Esta condición solo ocurre en animales PI que sufren sobreinfección con biotipos CP homólogos. En esta forma se aíslan ambos biotipos, que son antigénicamente similares. El biotipo CP surge de mutaciones del biotipo NCP, aunque no se descartan fuentes externas³⁰. Es una forma esporádica, fatal, de curso agudo o crónico y se caracteriza por severa leucopenia, diarrea profusa, erosiones y ulceraciones en el sistema digestivo^{1, 17}.

DIAGNÒSTICO

NECROPSIAS


En este tipo de diagnostico se pueden encontrar lesiones como se muestran en las siguientes imágenes.




Necrosis y desprendimiento de epitelio en los orificios nasales. (fig. 1)



Erosiones en la porción dorsal de la base de la lengua (fig. 2)




Erosión de las encías (fig. 3)




Erosiones en la porción ventral y bordes de la lengua (fig. 4)




Erosiones en la mucosa bucal (fig. 5)



Hemorragias y erosiones en la mucosa del paladar duro y blando (fig. 6)



Erosiones en la mucosa del esófago (fig. 7)



Congestión y erosión en la mucosa del rumen (fig. 8)




Abomasitis (fig. 9)



Hemorragias y erosiones en la mucosa del intestino delgado (fig. 10)



Hemorragias en una placa de Peyer (fig.11)



Hipoplasia cerebelar (fig. 12)

Debido al amplio tipo y severidad de lesiones inespecíficas, en ocasiones solo evidenciadas por microscopía, el diagnóstico se basa únicamente en el aislamiento del virus o detección del antígeno viral específico (5). El objetivo principal del diagnóstico es la detección y remoción de bovinos PI, principal fuente de infección y reservorio del virus.

- Serología. La distribución de anticuerpos en los distintos grupos de edades de rebaños con animales PI y sin animales PI, determina que existan 5 fases en el ciclo de infección:

Fase A: rebaños con infección aguda sin animales PI. Solo un pequeño porcentaje del rebaño será seropositivo.

Fase B: rebaños infectados con animales PI menores de 3 -4 meses de edad. La mayoría de los animales están bajo una infección aguda, a una velocidad variable dependiendo del sistema de producción.

Fase C: rebaños infectados con animales PI mayores de 3-4 meses de edad. Usualmente, más del 90% del rebaño es seropositivo.

Fase D: rebaños previamente infectados, donde los animales PI han sido removidos recientemente. Los animales jóvenes serán seronegativos cuando pierdan sus anticuerpos calostrales a los 6-8 meses de edad. Los animales adultos permanecen seropositivos.

Fase E: rebaño previamente infectado, donde los animales PI han sido removidos hace varios años. Todos los animales jóvenes serán seronegativos (excepto algunos terneros con anticuerpos calostrales). Eventualmente el rebaño se volverá seronegativo³⁰.

Estos estudios epidemiológicos han permitido desarrollar diferentes métodos serológicos para la detección de rebaños con infección activa (con bovinos PI) de manera simple, eficaz y económica.

El análisis serológico de una pequeña muestra de sangre tomada al azar de terneros de 6 a 12 meses de edad permite distinguir rebaños con infección activa, de rebaños sin bovinos PI, con un alto grado de seguridad (7, 17, 29). Se pueden cometer errores de clasificación cuando los rebaños poseen animales PI muy jóvenes, que no han tenido tiempo de infectar a los animales seronegativos remanentes, cuando los sistemas de explotación y la virulencia de la cepa permitan una diseminación lenta, o si se toma la muestra de animales menores de 6 meses de edad, los cuales tendrán anticuerpos colostrales. Estos problemas se solucionan repitiendo el examen unos meses después³⁰.

Medir el nivel de anticuerpos en leche almacenada en tanques también permite terminar el estatus infeccioso del rebaño y es ampliamente empleado en países que están controlando la enfermedad. Sin embargo, este método no distingue entre rebaños con animales PI y rebaños donde dichos animales han sido recientemente eliminados, debido a que los títulos de anticuerpos en la leche declinan lentamente. Se recomienda el uso de este método en las fases finales de un programa de erradicación y en la vigilancia de rebaños libre³⁰.

-Detección del virus o componentes virales. Una vez identificados los rebaños con infección activa, se debe testear individualmente a los animales para detectar a los bovinos PI. Para ellos contamos con cuatro métodos diferentes.

-Aislamiento viral. El aislamiento viral es el método de referencia, es 100% específico y altamente sensible. Sin embargo, es económicamente prohibitivo para ser usado en el diagnóstico de animales PI en un programa de control y erradicación²². El cultivo celular se ha optimizado con el sistema microtitre multi-well, donde células cultivadas en placas con múltiples pocillos son inoculadas con 10 a 50 ul de suero problema e incubadas por 4 días; la presencia de biotipos NCP se detecta con el empleo de anticuerpos anti-vDVB marcados con peroxidasa o fluorocromos¹³.

-Detección de antígenos mediante enzimo-inmunoensayo (ELISA). La prueba de ELISA utiliza anticuerpos monoclonales o policlonales para “capturar”

antígenos del vDVB en muestra de sangre. Comparado con el aislamiento viral, es un método rápido y económico, por lo tanto, es el método de preferencia para la detección a gran escala de animales PI²².

Los sistemas ELISA basados en anticuerpos policlonales dirigidos contra varias proteínas y glicoproteínas de cepas antigénicamente diferentes, son capaces de detectar una amplia variedad de vDVB. Este sistema, comparado con el aislamiento viral, ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad (97,9% y 99,7% respectivamente) y es comparable a los sistemas ELISA basados en un anticuerpo monoclonal 62. Por otra parte, los sistemas de ELISA basados en un anticuerpo monoclonal epítipo específico son cuestionables, debido a que su estrecho rango de especificidad puede fallar en detectar algunas cepas del vDVB²⁸.

-Detección de antígenos mediante inmunohistoquímica (IHQ). La IHQ se realiza, rutinariamente, en tejido fijado en formalina y embebido en parafina; aventajado a otras técnicas en términos de conveniencia en la remisión de las muestras, posibilita el estudio retrospectivo de muestras enviadas para examen histopatológico y permite una precisa asociación entre el antígeno viral con tipos celulares y lesiones histológicas²².

La presencia de del antígeno del vDVB en queratinocitos de la epidermis y células epiteliales de folículos pilosos de bovinos PI clínicamente normales 4, ha originado el desarrollo de la técnica inmunohistoquímica en biopsias de piel para el diagnóstico de estos animales. Esta técnica, en comparación con el aislamiento viral, ha demostrado ser eficaz, rápida, económica, sencilla y fácilmente implementable en cualquier laboratorio de histopatología. Además, la colección y remisión de las muestras al laboratorio es simple. Las muestras fijadas en formalina son más estables que las muestras de sangre o suero, evitándose así falsos negativos por autólisis o putrefacción, y los anticuerpos colostrales no interfieren con la técnica, permitiendo analizar terneros neonatos^{11, 33, 34}.

La inmunoreacción en piel de bovinos PI nos permite visualizar al vDVB como estructuras granulares de distinto diámetro, localizadas en el citoplasma de todas las células epiteliales de la epidermis y de los folículos pilosos, células de las glándulas sebáceas, células de las glándulas sudoríparas, histiocitos, musculo liso y células endoteliales¹⁴.

Este patrón de tinción y la distribución de la inmunoreacción son característicos de una infección persistente y deben tenerse en cuenta a la hora del diagnóstico inmunohistoquímico. Además, pudimos demostrar la presencia de antígenos del vDVB en el citoplasma de las células que conforman la vaina de la raíz de pelos extraídos manualmente de bovinos PI. Sin embargo, no recomendamos el empleo de muestras de pelo para el diagnóstico rutinario de estos animales, ya que pase a ser sumamente fácil la toma de muestra, es una técnica laboriosa que consume gran cantidad de reactivos y no permite el estudio simultáneo de numerosas muestras.

La inmunolocalización de este virus en tejidos fijados en formalina al 10% empleando anticuerpos monoclonales es difícil, ya que es un virus antigénicamente variable y sensible a los efectos de la fijación.

-Detección del ácido nucleico viral. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un método rápido, sensible, que detecta diversos vDVB y permite investigar un gran número de muestras en corto tiempo⁶. Su sensibilidad permite detectar el virus en pool de muestras de sangre y leche de tanque^{3,8}. Sin embargo, su elevada sensibilidad puede originar resultados falsos positivos¹.

Para maximizar la detección de vDVB se han seleccionado partidores de la región 5' no codificante del genoma pestiviral, ya que es la región del genoma que más se conserva entre los virus aislados 11. Se recomienda un cuidadoso examen de los partidores para asegurar que sean capaces de detectar todos los virus del genotipo 1 del vDVB.

ERRADICACIÓN

La erradicación de la diarrea viral bovina a nivel de rebaño es posible y, manteniendo el rebaño cerrado, mejora sustancialmente su salud y productividad¹⁷. Las estrategias de erradicación dependen de la seroprevalencia, uso de vacuna, densidad poblacional y práctica de manejo.

Erradicación sin vacunación. En regiones donde la seroprevalencia y la densidad poblacional es baja y no se emplean vacunas, la erradicación se basa en: 1) identificación de los rebaños con infección activa; 2) eliminación de animales PI del rebaño; y 3) medidas de bioseguridad o mantener rebaños cerrados para evitar la infección de rebaños libres^{6, 12}.

Erradicación con vacunación. En poblaciones bovinas con alta prevalencia de la enfermedad, donde no es posible mantener un rebaño cerrado o con estrictas medidas de bioseguridad, las estrategias de control deben incluir: 1) identificación de rebaños con infección activa; 2) eliminación de animales PI y 3) programa de vacunación en vacas y vaquillas. La vacunación por sí sola no elimina el virus del rebaño y su finalidad es proveer protección contra infecciones transplacentarias que den origen a terneros PI¹².

Experiencia europea. El impacto económico que causa el vDVB ha llevado a numerosos países europeos a iniciar programas de erradicación. La isla de Shetland fue la primera región libre de diarrea viral bovina¹⁷.

El plan de erradicación a nivel nacional que implementaron Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca provee un marco regulatorio para el control de las rutas de infección, determinación del estatus infeccioso de cada rebaño por examen serológico, por ELISA indirecto, de muestras de leche de estanque y/o de sangre de 5 terneros entre 8 y 12 meses de edad, detección y eliminación de animales PI positivos a un ELISA basado en anticuerpos policlonales para la detección de antígeno en sangre, así como examen serológico anual para mantener el estatus libre de infección⁶.

Los suecos iniciaron su plan de erradicación en el año 1993 y demostraron que esta es posible aun sin vacunación. Aunque la participación en el programa es voluntaria y los productores pagan los costos del muestreo y las pruebas, el 100% de los productores lecheros (11.735 rebaños) y más del 99% de los productores de carne (13.834 rebaños) se encontraban afiliados en el año 2001. Este año se declararon libres de vDVB el 92.5% de los rebaños lecheros y el 88% de los rodeos de carne, en tanto que numero de rebaños positivos continua disminuyendo.

La experiencia danesa demuestra que un programa de erradicación en áreas de alta prevalencia no puede ser seguro sin regulaciones oficiales que controlen las vías de transmisión y que coordine la erradicación en todos los rebaños de una región, ya que la principal vía de reintroducción del virus a un rebaño libre es atreves del contacto directo i indirecto con rebaños PI⁸.

Debido a la elevada prevalencia de la infección (más del 80%) y alta densidad animal, la estrategia de control se basa en la identificación y remoción de bovinos PI, mediante la detección de antígeno en sangre por el método ELISA, y la vacunación sistematica de las hembras, además de medidas de higiene y testeo de todo animal que ingrese al rebaño para prevenir la reintroducción del virus. Todavía no hay información sobre la eficiencia de este programa de control. Sin embargo, surge la necesidad de promover mayor educación e información a productores y veterinarios, ya que muchos rebaños no continúan con el programa luego del testeo inicial y eliminación de los bovinos PI³.

CONCLUSIONES

El vDVB tiene una distribución mundial y es un importante patógeno del bovino que, a pesar de su nombre, afecta principalmente la salud reproductiva del rebaño, originando importantes pérdidas económicas.

Debemos tener presente que en los rebaños con infección activa, el 60% o más de los bovinos son seropositivos y naturalmente inmunes al vDVB; por lo tanto, no tiene sentido vacunar a una población donde la mayoría de sus individuos ya está protegida. Los esfuerzos deben dirigirse a la detección y eliminación de los bovinos PI, principal fuente de infección y reservorio. La vacuna por si sola no elimina los animales PI y debe emplearse como una herramienta para evitar la reintroducción de la infección.

Queda mucho por investigar en términos de situación epidemiológica en distintas regiones, montaje de métodos diagnósticos eficaces e impacto económico de la infección, prerequisites indispensables para planear una estrategia de erradicación y control. Además, se desconoce la real participación de este virus como causal de patologías digestivas, respiratorias y reproductivas del bovino en nuestros sistemas de producción.

BIBLIOGRAFIA

1. Ames TR, 1986. The causative agent of BVD: its epidemiology and pathogenesis. *Vet. Med.* 81: 848-869.
2. Baker JC. 1987. Bovine viral diarrhoea virus: A review. *JAVMA* 190: 1449-1458.
3. Baule C. 2000. Molecular characterization of bovine viral diarrhoea virus, an important pathogen of cattle. *Acta Universit. Agric. Sueciae* 95: 9-38.
4. Bielefeldt Ohmann H. 1983. Pathogenesis of bovine viral diarrhoea-mucosal disease: distribution and significance of BVDV antigen in diseased calves. *Res. Vet. Sci.* 34: 5-10.
5. Bielefeldt Ohmann H. 1995. The pathologies of bovine viral diarrhoea virus infection. *Food Anim. Pract.* 11: 447-476.
6. Bitsch V, Ronsholt L. 1995. Control of bovine viral diarrhoea virus without vaccines. *Food Anim. Pract.* 11: 627-640.
7. Bitsch V, Houe H, Nylin B, Ronsholt L. 1997. Examination of blood and bulk tank milk samples to monitor the bovine viral diarrhoea infections of cattle herds, proceedings of the 3th symposium on pestiviruses, sept, 1996, IJsselstad, Netherlands. *ESVV*, pp. 158-161.
8. Bitsch V, Hansen K, Ronsholt L. 2000. Experiences from the Danish programme for eradication of bovine virus diarrhoea (BVD) 1994-1998 with special reference to legislation and causes of infection. *Vet. Microbiol.* 77: 137-143.
9. Bolin SR, Ridpath JF. 1992. Differences in virulence between two noncytopathic bovine viral diarrhoea virus in calves. *Am. J. vet. Res.* 53: 2157-2163.

10. Brodersen BW, Kelling CL. 1998. Effect of concurrent experimentally induced bovine respiratory syncytial virus and bovine viral diarrhea virus infections on respiratory tract and enteric diseases in calves. *Am. J. vet. Res.* 59: 1423-1430.
11. Brodersen BW, White AK, Smith DR. 1998. Immunohistochemical test on Skin biopsies as a method for detection of cattle persistently infected with bovine viral diarrhea virus. *Proc. Am. Assoc. bov. Pract.* 31:246.
12. Brownlie J, Thompson I, Curwen A. 2000. Bovine virus diarrhea virus-strategic decisions for diagnosis and control. *In Practice* 22: 176-187.
13. Caropi WV, Donis RO, Dubovi EJ. 1990. Characterization of panel of monoclonal antibodies and their use in the study of the antigenic diversity of bovine viral diarrhea virus. *Am. J. Vet. Res.* 51: 1388-1394.
14. Constable PD, Hull BL, Wicks JR, Myer W. 1993. Femoral and tibial fractures in a newborn calf after transplacental infection with bovine viral diarrhea virus. *Vet. Rec.* 132: 383-385.
15. David GP, Crawshaw TR, Gunning RF, Hibberd RC, Lloyd GM, Marsh PR. 1994. Severe disease in adult dairy cattle in three UK dairy herds associated with BVD virus infection. *Vet. Rec.* 134: 468-472.
16. Deregt D, Loewen KG. 1995. Bovine viral diarrhea virus: biotypes and disease. *Can. Vet. J.* 36: 371-377.
17. De Verdier Klingenberg K, Vagsholm I, Alenius S. 1999. Incidence of diarrhea among calves after strict closure and eradication of bovine viral diarrhea virus infection in a dairy herd. *JAVMA* 214: 1824-1828.

18. De Verdier Klingenberg K. 2000. Enhancement of clinical sign in experimentally rotavirus infected calves by combined viral infections. *Vet. Rec.* 147: 717-719.
19. Donis RO. 1995. Molecular biology of bovine viral diarrhea virus and its interactions with the host. *Food Anim. Pract.* 11: 393-423.
20. Drake TR, Moore DA, Whitlock RH, Castro AE, Hattel AL, Reams R, Stoffregen W. 1996. An outbreak of acute BVD in Pennsylvania cattle. *International Symposium Bovine Viral Diarrhea Virus a 50 Year Review*, Cornell University, USA, pp. 208.
21. Dubovi EJ. 1994. Impact of bovine viral diarrhea virus on reproductive performance in cattle. *Food Anim. Pract.* 10: 503-514.
22. Dubovi EJ. 1996. Laboratory diagnosis of bovine viral diarrhea virus infections. *Vet. Med.* 91: 867-872.
23. Ellis JA, Martin K, Norman GR, Haines DM. 1995. Comparison of detection methods for bovine viral diarrhea virus in bovine abortions and neonatal death. *J. Vet. Diagn. Invest.* 7: 433-436.
24. Fray MD, Prentice H, Clarke MC, Charleston B. 1998. Immunohistochemical evidence for the localization of bovine viral diarrhea virus, a single-stranded RNA virus, in ovarian oocytes in the cow. *Vet. Pathol.* 35: 253-259.
25. Fray MD, Mann GE, Clarke MC, Charleston B. 1999. Bovine viral diarrhea virus: its effects on estradiol, progesterone and prostaglandin secretion in the cow. *Theriogenology* 51: 1533-1546.
26. Fray MD, Paton DJ, Alenius S. 2000. The effects of bovine viral diarrhea virus on cattle reproduction in relation to disease control. *Anim. Reprod. Sci.* 60-61: 615-627.

27. Fredriksen B, Sandvik T, Loken T, Odegaard SA. 1999. Level and duration of serum antibodies in cattle infected experimentally and naturally with bovine viral diarrhoea virus. *Vet. Rec.* 144: 111-114.
28. Graham DA, McLaren IE, German A. 1998. Evaluation of the suitability of a commercial bovine viral diarrhoea virus antigen capture ELISA for diagnostic testing. *Vet. J.* 157: 149-154.
29. Grahn TC, Fahning ML, Zemjanis R. 1984. Nature of early reproductive failure caused by bovine viral diarrhoea virus. *JAVMA* 185: 429-432.
30. Grooms DL. 1998. Role of bovine viral diarrhoea virus in the bovine respiratory disease complex. *Bov. Pract.* 32: 7-12.
31. Grooms DL, Brock KV, Ward LA. 1998. Detection of bovine viral diarrhoea virus in the ovaries of cattle acutely infected with bovine viral diarrhoea virus. *J. Vet. Diag. Invest.* 10: 125-129.
32. Grooms DL, Brock KV, Pate JL, Day ML. 1998. Changes in ovarian follicles following acute infection with bovine viral diarrhoea virus. *Theriogenology* 49: 595-605.
33. Grooms DL, Keilen ED. 2002. Screening of neonatal calves for persistent infection with bovine viral diarrhoea virus by immunohistochemistry on skin biopsy samples. *Clin. Diagn. Lab. Imm.* 9: 898-900.
34. Haines DM, Clark EG, Dubovi EJ. 1992. Monoclonal antibody-based immunohistochemical detection of bovine viral diarrhoea virus in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. *Vet. Pathol.* 29: 27-32.
35. Hamers C, Couvreur B, Dehan P, Letellier C, Lewalle P, Pastoret P, Kerkhofs P. 2000. Differences in experimental.