

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
“ANTONIO NARRO”
UNIDAD LAGUNA**



DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL

**“MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA CHILL 5 PARA LA
PRESERVACIÓN DEL SEMEN CANINO”**

POR

FLOR DEL CARMEN AMAYA FLORES

TESIS

**PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA
OBTENER EL**

TÍTULO DE:

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO

Noviembre 2012

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA

"ANTONIO NARRO"

**UNIDAD LAGUNA
DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL**



**"MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA CHILL 5 PARA LA
PRESERVACIÓN DEL SEMEN CANINO"**

POR:

FLOR DEL CARMEN AMAYA FLORES

ASESOR PRINCIPAL

Firma manuscrita de Carlos Raúl Rascón Díaz.

MVZ CARLOS RAÚL RASCÓN DÍAZ

COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL

Firma manuscrita de Rodrigo Isidro Simón Alonso.

M.V.Z. RODRIGO ISIDRO SIMÓN ALONSO
Coordinación de la División Regional de Ciencia Animal



TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO

NOVIEMBRE, 2012

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
"ANTONIO NARRO"
UNIDAD LAGUNA
DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL



**"MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA CHILL 5 PARA
LA PRESERVACIÓN DEL SEMEN CANINO"**


TESIS POR:
FLOR DEL CARMEN AMAYA FLORES


Elaborado bajo la supervisión del comité particular y aprobado como requisito parcial para
optar por el título de:


MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA


JURADO:


CARLOS RAÚL RASCÓN DÍAZ
PRESIDENTE


MVZ. SILVESTRE MORENO ÁVALOS
VOCAL


MVZ. CUAUTHÉMOC FÉLIX ZORRILLA
VOCAL


MVZ. EDMUNDO GÚZMAN RAMOS
VOCAL SUPLENTE


MVZ. RODRIGO SIDRO SIMÓN ALONSO
COORDINADOR DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL



TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO

NOVIEMBRE, 2012

AGRADECIMIENTOS

A DIOS NUESTRO SEÑOR

Señor Dios, una vez más te doy las gracias por tu inmenso amor, por todas las bendiciones que derramas en mi familia, agradezco escuchar mis plegarias y no soltarme de la mano cuando más te necesito, agradezco por la salud y estos años vividos.

A MI ALMA, TERRA, MATER

Por ser la universidad que permitió realizar y terminar mis estudios profesionales, siempre llevaré su nombre en alto, por esto y más, gracias.

A MI ASESOR M.V.Z. CARLOS RAUL RASCON DIAZ

Por todo el apoyo a lo largo de este proyecto y por su disposición permanente e incondicional en aclarar mis dudas y apoyarme durante la redacción de esta tesis, su esfuerzo y dedicación, su conocimiento, por la persistencia, paciencia y motivación que han sido fundamentales para mi formación profesional.

A MI JURADO

M.V.Z. SILVESTRE MORENO AVALOS, M.V.Z. CUAUHTÉMOC ZORRILLA FÉLIX, M. V. Z EDMUNDO GUZMÁN RAMOS gracias por darme la oportunidad, consejos y experiencias que gracias a ello me han servido demasiado.

A MIS AMIGOS

Por pasar a mi lado los momentos de mi vida universitaria y estar siempre en las buenas y en las malas; jamás los olvidare.

DEDICATORIAS

A MIS PADRES

MA. SILVRESTRE FLORES ORTIZ, MARCELINO AMAYA HERNANDEZ por brindarme el apoyo y la oportunidad de poder superarme, de estar en los momentos más difíciles de mi estancia, por aportarme enseñanzas y educación a lo largo de mi vida, por ser la base y el pilar de una imagen ejemplar de superación.

Agradezco el amor incondicional, comprensión, y confianza que depositaron en mí para ser una persona de provecho.

A MIS HERMANOS

JONATHAN MARCE AMAYA FLORES, DARYANEL AMAYA FLORES por la paciencia, por aquellos consejos, preocupaciones y ánimos constantes, y sobre todo por ser los mejores hermanos que Dios me haya podido dar.

A MIS TIAS CON LAS QUE ASISTI

PETRA AMAYA HERNANDEZ, PATRICIA GUADALUPE FLORES SANCHEZ, SANDRA AMAYA HERNANDEZ por el apoyo y los consejos que han sido de gran ayuda, gracias por abrirme las puertas de su casa, y poder compartir sus alegrías.

A MIS PRIMOS

Por hacerme pasar los días increíbles, por brindarme el cariño como el de un hermano (a), y por el apoyo y consejo como el de un amigo (a).

“GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE NO ESTÁN AQUÍ, PERO QUE ME AYUDARON A QUE ESTE GRAN ESFUERZO SE HICIERA REALIDAD”.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	i
DEDICATORIAS.....	ii
ÍNDICE DE CUADROS.....	vi
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vii
RESUMEN.....	viii
I.- INTRODUCCIÓN.....	1
II.- ANTECEDENTES.....	4
III.- ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DEL PERRO.....	4
3.1. Órganos genitales del macho.....	4
3.1.1. Escroto.....	4
3.1.2. Testículos.....	5
3.1.3. Epidídimo.....	5
3.1.4. Conductos deferentes.....	5
3.1.5. Cordón espermático (funículos spermaticus).....	6
3.1.6. Canal inguinal.....	6
3.2. Glándulas genitales accesorias.....	7
3.2.1. Glándulas vesiculares.....	7
3.2.2. Próstata.....	7
3.2.3. Glándulas bulbouretrales.....	7
3.3. Genitales externos.....	7
3.3.1. Pene.....	7
3.3.2. Prepucio.....	8
3.3.3. Uretra masculina.....	8
IV.- ENDOCRINOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN.....	9

4.1. Hormonas hipotalámicas.....	9
4.1.1. Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).....	9
4.2. Hormonas hipofisarias.....	9
4.2.1. Hormona folículo estimulante (FSH).....	9
4.2.2. Hormona luteinizante (LH).....	10
4.2.3. Prolactina.....	11
4.3. Hormonas foliculares.....	11
4.3.1. Estrógenos.....	11
4.3.2. Progesterona.....	12
4.3.3. Prostaglandinas.....	12
4.3.4. Andrógenos.....	12
4.3.5. Inhibina.....	13
V.- FISIOLÓGÍA DE LA REPRODUCCIÓN.....	13
5.1. Fisiología de la Reproducción del Macho.....	13
5.1.1. Espermatogénesis.....	13
5.1.2. Control de la temperatura.....	15
5.1.3. Transporte del semen.....	15
5.1.4. Erección.....	16
5.1.5. Eyaculación.....	17
VI.- CARACTERÍSTICA DEL SEMEN FRESCO VS. REFRIGERADO.....	18
6.1 Semen fresco vs. Refrigerado.....	18
6.1.1. Semen fresco.....	18
6.1.2. Semen refrigerado.....	19
VII.- OBJETIVOS.....	20
VIII.- HIPÓTESIS.....	20

IX.- MATERIAL Y METODOS.....	20
X.- RESULTADOS.....	24
XI.- DISCUSIÓN.....	27
XII.- CONCLUSIÓN.....	28
XIII.- LITERATURA CITADA.....	29

ÍNDICE DE CUADROS

Tabla 1. Dilución de semen por ml y extender CaniPROChill 5.....	22
En la tabla 2. Aparecen los animales utilizados en el experimento.....	24
Tabla 3. Comparación macroscópica y microscópica del semen obtenido.....	25
Tabla 4. Porcentaje de Motilidad Espermática (%ME) del inicio al final del Experimento.....	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Grafica 1. Porcentaje de Motilidad Espermática de la Media.....26

Grafica 2. Porcentaje de motilidad espermática por canino.....26

RESUMEN

Se hizo y se realizó un estudio de semen refrigerado en caninos, con la modificación de la técnica de CaniPRO Chill 5, con el fin de comparar, evaluar la MOTILIDAD y anomalías primarias y secundarias del semen refrigerado; y compararlo con la técnica que expresa el laboratorio de los diluyentes; para verificar el resultado del proceso utilizado; por otra parte se comprobará por medio de la inseminación artificial en otro estudio comprobando la calidad espermática con el porcentaje de gestación obtenida.

Dicho experimento se utilizaron 5 machos, con diferente peso, raza, edad y clínicamente sanos. El estudio para este experimento fue realizando un examen de calidad espermática (concentración, motilidad, morbilidad, morfoanomalías).

Para realizar esta modificación de la técnica, se utilizó el kit comercial CaniPRO Chill 5 para la refrigeración del semen; las características microscópicas en el semen fresco fueron prácticamente similares entre machos; sin embargo, tras el proceso de la modificación de refrigeración, se observaron diferencias no significativas, en la calidad seminal, especialmente en la motilidad espermática, la cual disminuyó paulatinamente conforme el experimento avanzó entre un 5% a 8% por día. Cabe mencionar que el promedio de volumen eyaculado fue de 2.5 ml, lo cual nos da un promedio de diez pajillas por eyaculado, para la preservación.

Los resultados obtenidos en la técnica confirmaron que el uso de la modificación derefrigeración es una alternativa potencial para conservar semen canino durante periodos a cortotiempos. Concluyendo así, la técnica con semen refrigerado a 5, 7, 9 días es eficiente y es de gran utilidad cuando tenemos un número mayor de hembras en las cuales podemos dosificar la cantidad de semen obtenido para posteriormente utilizarla, así mismo nos ahorramos material, ya que con la modificación de la técnica, el producto sirve para una mayor dosificación de pajillas; De esta manera inseminamos un mayor número de hembras con la misma

colecta de semen y a su vez podemos recorrer distancias largas o cortas para realizar la modificación de la técnica, sin tener que movilizar al macho, y en fin un número de ventajas que se mencionan en el contexto del trabajo.

PALABRAS CLAVE: Semen refrigerado, concentración espermática, motilidad espermática, CaniPROChill 5, azoospermia.

I.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se menciona que las técnicas de inseminación artificial y criopreservación seminal en la especie canina han experimentado un enorme desarrollo. El porcentaje de gestaciones obtenido en perras inseminadas con semen en fresco se dice que es muy elevado, si se realiza una inseminación intravaginal profunda (Farstad y Andersen Berg, 1989; Forsberg, 1989) y una técnica de inseminación intrauterina (Silva y Verstegen, 1995; Silva y col., 1996).

En los cachorros de pura raza ha aumentado las posibilidades de comercialización; así como la importancia de la cría, desde el punto de vista económico y recreativo. Y para la obtención de los perros de trabajo se ha impulsado el desarrollo e implementaciones de biotecnologías reproductivas (storelli,2001).

Diversas metodologías de criopreservación de semen, se están aplicando cada vez con más frecuencia con el fin de establecer bancos de reserva genética para conservar las diferentes especies en el futuro (Luvoni G, 2000).

En el proceso de la refrigeración disminuye la tasa metabólica y prolonga la sobrevivencia Espermática. Los diluyentes de semen que se utilizaron para el proceso de refrigeración protegen las membranas espermáticas de los daños causados por los cambios de temperatura, proveen energía, estabilizan el pH y la presión osmótica (Stornelli, M. A, 2007.).

Sin embargo, es difícil llevar a cabo una comprobación experimental, ya que es necesario el uso de un gran número de animales para obtener conclusiones definitivas. En muchos estudios realizados, la calidad seminal del semen refrigerado se valora mediante la determinación de diferentes parámetros seminales como la motilidad, la integridad de la membrana plasmática, las

acrosomías y las morfoanomalías (Thomas y col., 1993; Ivanova y col., 1997; Peña y Linde-Forsberg, 2000a, b; Peña y col., 2003; Álamo y col., 2005).

Diferentes autores han intentado establecer una correlación entre la fertilidad obtenida con una muestra de semen y la valoración seminal de los diferentes parámetros mencionados anteriormente (Rota y col., 1995). La motilidad post-refrigeración parece ser el mejor indicador de la fertilidad seminal (Nöthling y col., 1997).

Por otro lado, en la mayoría de estudios desarrollados en la especie canina, antes del procesamiento del semen, se hace un acumulo de los eyaculados de machos diferentes (Hay y col, 1997; Peña y Linde-Forsberg, 2000a; Peña y col, 2003).

Por tanto resulta imposible establecer si existe variación individual. En la especie canina, se han desarrollado diferentes protocolos de criopreservación seminal 3 utilizando diferentes tipos de diluyentes (Dobrinski y col., 1992; Fontbonne y Badinand, 1993; Nöthling y col., 1997; Ström y col., 1999) El porcentaje de fertilidad tras realizar una inseminación con semen refrigerado varía entre un 50-60% (Silva y Verstegen, 1995; Silva y col., 1996). Por otro lado, los perros muestran una gran variabilidad en la calidad seminal pos refrigeración, (Peña y col., 2003).

Por lo que resulta necesario desarrollar nuevas técnicas de criopreservación seminal para obtener mayores porcentajes de fertilidad tras la realización de una inseminación artificial con semen refrigerado. Sin embargo, el bajo número de animales utilizados en este trabajo, hace necesario completar esta investigación utilizando un mayor número de animales y conservando las muestras durante periodos de tiempo más largos (stornelli y col. 2007).

Se dice que por décadas, muchas de las camadas han sido por medio de IA con semen fresco, refrigerado y congelado. Sin embargo las tasas de preñez obtenidas a partir de IA usando semen refrigerado son aún poco satisfactorias y

esto ocurre en particular con las obtenidas bajo condiciones clínicas (stornelli y col. 2007).

En la clínica reproductiva diaria las variables asociadas al manejo del semen en la refrigeración, la técnica de IA implementada y a la detección del momento de mayor fertilidad están fuertemente influenciadas por el entrenamiento del operador actuante, a la infraestructura de la clínica en la que se realiza el procedimiento y al estado de salud y nutrición de los reproductores utilizados (Farstad, W. 2000).

Estos hechos se relacionan tanto con las particularidades de la fisiología reproductiva de la hembra como con la especial sensibilidad del semen canino a los procesos de criopreservación y la falta de desarrollo en esta área (Johnston ,2001), Es así que son necesarias investigaciones dirigidas a mejorar la habilidad para mantener la capacidad fecundante del semen refrigerado en caninos y obtener así tasas de preñez y tamaños de camada satisfactorios (stornelli y col 2007).

II.- ANTECEDENTES

Se practicaba la IA hasta hace poco tiempo, exclusivamente con semen fresco, posteriormente comenzó a utilizarse semen refrigerado. En muchos países la IA con semen refrigerado es una práctica rutinaria. Este método de criopreservación de semen puede ser implementado con bajo costo, fácil manejo y moderada infraestructura, mejorando así las posibilidades del uso del semen de reproductores valiosos (Sánchez, A. 2000).

La utilización de semen refrigerado con diluyentes protectores como el tris-buffer con el agregado de 20 %.

Una forma de conservar a los espermatozoides con buena capacidad fecundante, es con la yema de huevo, esto sirve para que los espermatozoides se conserven por un periodo de tiempo, suficiente para poder trasladar el semen e inseminar a los animales ubicados en distintos países (stornelli ma, 2001).

La yema de huevo es un componente habitual de los diluyentes para semen debido a que sus fosfolípidos y proteínas de baja densidad protegen al espermatozoide del shock de frío (Foulkes JA, 1977.).

Esto hace posible la IA de una hembra con el semen de un macho que se encuentre en otra provincia u otro país limítrofe o cercano con mínimo gasto y baja complejidad de manejo. De esta manera se amplían las posibilidades de uso de un reproductor, permitiendo la comercialización de semen y facilitando el intercambio genético entre diferentes establecimientos (Stornelli MA, 2001).

III.- ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DEL PERRO

3.1. Órganos genitales del macho

3.1.1. Escroto

Es un saco membranoso dividido por un septum medio en dos cavidades, ocupadas cada una por los testículos, epidídimo y parte distal del cordón espermático. Está situado entre la región inguinal y el ano (Sisson *et al.*, 1993).

Un músculo especial en la piel del escroto, regula la proximidad de los testículos a la pared abdominal influyendo así sobre su temperatura (Allen, 1992). La red compleja de suministro de sangre también contribuye a mantener la temperatura de los testículos por debajo de la temperatura normal del cuerpo. Esto facilita el desarrollo óptimo de los espermatozoides (Cunningham, 1999; Davol, 2000).

3.1.2. Testículos

Los testículos del macho canino son relativamente pequeños, tienen forma oval o redondeada, su eje mayor es oblicuo y está dirigido dorsal y caudalmente (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993). Atraviesan el canal inguinal entre los 4 y 5 días de edad (Cunningham, 1999), y alcanzan su ubicación en el escroto en 35 días (Allen, 1992).

3.1.3. Epidídimo

El epidídimo es largo, extremadamente enrollado sobre sí mismo e íntimamente unido a lo largo de la parte dorsal de la superficie lateral del testículo (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993). Es una estructura formada por cabeza, cuerpo y cola. Los espermatozoides maduran en su paso a través de él, y en el perro, este recorrido se efectúa en 14 días (Allen, 1992).

3.1.4. Conductos deferentes

Los conductos deferentes, son la continuación de la cola del epidídimo, con una ampolla estrecha en el perro y entran a la superficie craneo dorsal de la próstata (Cunningham, 1999; Davol, 2001; Sisson *et al.*, 1993). Este conducto transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra, y tiene un diámetro de 1 mm aproximadamente (Allen, 1992).

3.1.5. Cordón espermático (funículos spermaticus)

El cordón espermático comienza en el anillo inguinal profundo, donde sus partes constituyentes se juntan, se extiende oblicua y centralmente a través del canal inguinal y pasa junto al pene para terminar en el borde de inserción del testículo.(Sisson et al., 1993)

Está formado por las siguientes estructuras:

1. Arteria testicular.
2. Venas testiculares.
3. Linfáticos que acompañan a las venas.
4. Plexo testicular de nervios autónomos.
5. Conductos deferentes, arteria y vena.
6. Haces de tejido muscular liso alrededor de los vasos.
7. Capa visceral de la túnica vaginal.

El cordón espermático y la túnica vaginal son largos y cruzan al lado del pene muy oblicuamente. El extremo más superior de la túnica está algunas veces cerrado, de modo que no existe anillo vaginal (Sisson *et al.*, 1993).

3.1.6. Canal inguinal

Los vasos espermáticos y el conducto deferente penetran en el abdomen a través de un espacio estrecho en los músculos de la pared abdominal, que se conoce como el canal inguinal (Allen, 1992).

3.2. Glándulas genitales accesorias

3.2.1. Glándulas vesiculares

Las glándulas vesiculares no están presentes en el perro (Cunningham, 1999; Sisson *et al.*, 1993).

3.2.2 Próstata

Allen (1992), considera a la próstata como la única glándula accesoria en el perro. La próstata es relativamente grande y a menudo está alargada, especialmente en los animales viejos (Cunningham, 1999; Sisson *et al.*, 1993).

Es de color amarillento y con una estructura densa. Se localiza a la altura del borde craneal del pubis o cerca de él, rodeando el cuello de la vejiga y la uretra (Sisson *et al.*, 1993).

Es una estructura bilobulada en la entrada de la pelvis. La uretra atraviesa la glándula antes de llegar a la base del pene. La próstata aumenta normalmente de tamaño según avanza la edad. Esta glándula produce una secreción transparente que es expulsada al interior de la uretra; ésta secreción es conocida como fluido prostático, y constituye la primera y tercera fracción del eyaculado; tiene poder bactericida (Allen, 1992).

3.2.3. Glándulas bulbouretrales

Las glándulas bulbouretrales no están presentes en el perro (Cunningham, 1999).

3.3. Genitales externos

3.3.1. Pene

El pene está compuesto de raíz, cuerpo y glande. En su parte caudal existen dos cuerpos cavernosos visibles, separados por un tabique medio. En su parte craneal

hay un hueso, élos *penis*, que es un hueso rodeado por el glande (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993). En los perros grandes alcanza una longitud de 10 cm. o más. Está considerado como una parte del cuerpo cavernoso que se ha osificado (Sisson *et al.*, 1993).

El glande es muy grande y se extiende sobre toda la longitud del pene; su parte craneal, llamada *pars longa glandis*, es cilíndrica, con un extremo libre puntiagudo, constituye las tres cuartas partes distales del glande y termina en la abertura de la uretra; caudalmente existe un alargamiento redondeado, llamado bulbo del glande, que sin erección es difícil de apreciar, pero que cuando el pene se encuentra en erección consiste en un abultamiento más o menos esférico responsable de la fijación del pene en la vagina de la perra durante el apareamiento (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993).

3.3.2. Prepucio

El prepucio forma una vaina completa alrededor de la parte craneal del pene(Sisson *et al.*, 1993). Cubre completamente el pene no erecto (Allen, 1992). La capa más externa es ordinariamente integumento. Las capas internas son delgadas, de color rojizo y glandular. Presenta una mucosa que se continúa con la mucosa del pene en el glande peniano. En estas capas hay muchos nódulos linfáticos, que son especialmente grandes y a menudo prominentes en el fondo de la cavidad prepucial (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993).

3.3.3. Uretra masculina

Este conducto tiene la misión de transportar tanto la orina como el semen al extremo del pene (Allen, 1992). La parte pelviana de la uretra es relativamente grande. Su primera porción se extiende desde la vejiga y está cubierta por la próstata (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993).

IV.- ENDOCRINOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

4.1. Hormonas Hipotalámicas

4.1.1. Hormona liberadora de Gonadotropina (GnRH)

Es producida en el hipotálamo (en la base del encéfalo) y transportada hasta la glándula pituitaria anterior (adenohipófisis) mediante un sistema especializado de vasos sanguíneos. Esta hormona determina de forma selectiva la liberación de la Hormona Folículo Estimulante (FSH) y de la Hormona Luteinizante (LH) (Allen, 1992; Ruckebusch *et al.*, 1991), estas dos hormonas (FSH y LH) participan en el control de la reproducción en mamíferos machos y hembras (Ruckebusch *et al.*, 1991).

La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), se libera en pulsaciones casi cada dos horas. Su liberación se aumenta por la noradrenalina y el estradiol. También influyen en la liberación de GnRH las feromonas que estimulan el bulbo olfatorio y señales luminosas que actúan en la retina. La dopamina, opioides y endorfinas inhiben la descarga de GnRH. También el tratamiento prolongado con corticosteroides y el estrés tienen una retroalimentación negativa en la producción de GnRH por el hipotálamo. Cuando los niveles de estradiol son altos, el GnRH favorece la producción de la Hormona Luteinizante (LH) en lugar de Hormona Folículo Estimulante (FSH). En contraste, altas concentraciones de progesterona y bajas de estrógenos apoyan una producción hipotalámica de GnRH, dando así prioridad a producir FSH (Ruckebusch *et al.*, 1991).

4.2. Hormonas Hipofisarias

4.2.1. Hormona Folículo Estimulante (FSH)

Es sintetizada y liberada en la adenohipófisis por estimulación de la hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámicas (GnRH) (Ruckebusch *et al.*, 1991). En la hembra es la responsable de estimular el desarrollo de los folículos en los 11 Ovarios (Allen, 1992; Ruckebusch *et al.*, 1991). No han sido bien determinadas las concentraciones circulantes en la perra (Allen, 1992).

La síntesis y liberación de Hormona Folículo Estimulante (FSH), está bajo la influencia de altas concentraciones sostenidas de estradiol. Por el contrario una elevación de progesterona aumenta la producción de GnRH, estimula la producción de FSH (Ruckebusch *et al.*, 1991).

En el macho es responsable de la estimulación de algunos de los procesos en la espermatogénesis (Allen, 1992; Ruckebusch *et al.*, 1991).

4.2.2. Hormona Luteinizante (LH)

Es producida en la adenohipófisis por estimulación de la hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámicas (GnRH) (Ruckebusch *et al.*, 1991).

En la hembra es liberada en forma de pulsaciones cortas y la frecuencia de estas pulsaciones aumenta 1 ó 2 semanas antes de comenzar el proestro. Las concentraciones circulantes aumentan hasta alcanzar un máximo 48 horas antes de que ocurra la ovulación, por eso se le conoce como hormona ovulatoria (Allen, 1992; Ruckebusch *et al.*, 1991).

Su función es estimular la maduración, luteinización y ovulación de los folículos ováricos (Allen, 1992), y mantiene la luteinización folicular en la hembra que ovula (Ruckebusch *et al.*, 1991), por lo cual se considera luteotrófica (mantiene el funcionamiento de los cuerpos lúteos) (Allen, 1992).

En el macho es la responsable de la estimulación de las células intersticiales (células de Leydig) en el testículo para producir testosterona y dihidrotestosterona, y por lo tanto se le conoce como hormona estimulante de las células intersticiales (ICSH) (Allen, 1992; Ruckebusch *et al.*, 1991).

Al inicio de la pubertad, los niveles altos de Hormona Luteinizante inducen a los testículos para producir testosterona, que llevará a la maduración de los espermatozoides (Davol, 2001).

4.2.3. Prolactina

Producida y liberada por la adenohipófisis. Actúa sobre la glándula mamaria para estimular la producción de leche. Sus concentraciones en sangre suelen aumentar de acuerdo a la disminución de las concentraciones de progesterona, aunque en algunos casos la progesterona puede estimular la liberación de prolactina. La prolactina también es considerada luteotrófica (mantiene el funcionamiento del cuerpo lúteo) (Allen, 1992).

4.3. Hormonas foliculares

4.3.1. Estrógenos

Hormonas esteroideas producidas en la perra por folículos en crecimiento. Los principales son 17-estradiol, 17-estradiol y estrona, algunos de los cuales pueden ser conjugados. Las concentraciones circulantes aumentan poco días antes del inicio del proestro, posteriormente se produce un aumento brusco de sus concentraciones en sangre, alcanzando su máximo 48 horas antes de la oleada de LH (Allen, 1992). Los estrógenos determinan cambios que tienen lugar en el proestro, como pueden ser: (Allen, 1992).

- a) Flujo vaginal
- b) Engrosamiento de la mucosa vaginal
- c) Cambio en la consistencia de la mucosidad cervical
- d) Tumefacción de la vulva
- e) Producción de feromonas

4.3.2. Progesterona

Es una hormona esteroide producida por folículos maduros y por el cuerpo lúteo. Las concentraciones circulares aumentan cuando los estrógenos alcanzan su máximo, al final del proestro. La hormona es producida por las células de la granulosa en vías de luteinización en los folículos intactos (Allen, 1992).

Los valores en el plasma aumentan de forma constante a un promedio de 2 a 3 ng./ml. y se incrementan en el momento de la ovulación a más de 5 ng./ml. (5 a 8 ng./ml.), las concentraciones máximas se alcanzan unos 20 días después de finalizado el estro, se encuentre la perra en gestación o no. Posteriormente se produce un descenso gradual hasta sus valores mínimos, que son alcanzados 60 a 70 días después de la ovulación(Allen, 1992 Davol, 2000 Hutchison, 2001).

4.3.3. Prostaglandinas

En la perra la producción espontánea de prostaglandina por el útero no es responsable de la lisis de los cuerpos lúteos, tal como sucede en otras especies. Los cuerpos lúteos en la perra dejan de ser funcionales de forma gradual debido a la ausencia de un apoyo trófico (LH y/o prolactina) o porque tienen un ciclo vital limitado (Allen, 1992), de 63 días en las hembras preñadas y de 100 días en las hembras no gestantes (Esquivel, 2002)

4.3.4. Andrógenos

Son producidos por células en los testículos que forman pequeños islotes entre los túbulos seminíferos; estas son las células intersticiales o células de Leydig (Allen, 1992).

La conversión de testosterona a dihidrotestosterona inducirá el desarrollo de la 14 Glándula próstata, la uretra masculina, el pene, y el escroto (Allen, 1992; Davol, 2001). Después, los testículos descienden al escroto y completan el desarrollo del sistema reproductor masculino (Davol, 2001). Los efectos adicionales de la testosterona incluirán la inducción de otras características físicas del género así como los rasgos de conducta, incluyendo la conducta de apareamiento y

marcando de territorio con orina (Allen, 1992; Davol, 2001). En los perros adultos las concentraciones de testosterona en plasma varían entre 0,5 y 5,0 ng./ml. En perros castrados, los valores son inferiores a 200 pg./ml. (Allen, 1992).

Se desconocen las funciones de éstas hormonas en la perra, pero se sabe que sus concentraciones circulantes alcanzan un máximo al mismo tiempo que la oleada de LH (Allen, 1992).

4.3.5. Inhibina

Esta es una hormona producida en los testículos por las células de Sertoli que inhibe la liberación de FSH (Allen, 1992; Davol, 2000; Ruckebusch *et al.*, 1991). No se ha demostrado su existencia en el perro (Allen, 1992).

V. FISIOLÓGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

5.1. Fisiología de la Reproducción del Macho

El testículo es el órgano de apoyo para el sistema reproductor masculino; sin embargo hay que recordar que todas las funciones testiculares se encuentran influenciadas por el sistema neuroendocrino (Cunningham, 1999).

5.1.1. Espermatogénesis

Constituye un proceso complejo mediante el cual se producen los espermatozoides (células germinativas masculinas) en los tubos seminíferos de los testículos (Allen, 1992; Cunningham, 1999; Davol, 2001). Las células llamadas *espermatogonias*, que son las precursoras de los espermatozoides, se dividen de forma normal (mitosis) para dar origen a muchos *espermatoцитos*. Los espermatoцитos se dividen posteriormente mediante meiosis, por lo que el número normal de cromosomas queda reducido a la mitad (39) en las células resultantes que son llamadas espermátidas y se describen como *haploides* (con la mitad del número normal de cromosomas; las células con 78 cromosomas son llamadas *diploides*; en este número se incluyen los dos cromosomas sexuales). Las espermátidas se transforman en espermatozoides mediante un complejo reagrupamiento de los organelos; básicamente el núcleo pasa a formar la cabeza

del espermatozoide, el aparato de Golgi forma el acrosoma, y las mitocondrias y centriolos intervienen en el desarrollo de la cola. La mayor parte del citoplasma queda en las *células de Sertolique* que aparecen sobre la membrana basal de los tubos seminíferos que regulan la metamorfosis de espermátida a espermatozoide (Allen, 1992; Cunningham, 1999).

La espermatogénesis comienza a los 4 meses de edad aunque los espermatozoides no aparecen en el eyaculado hasta los 10-12 meses (Allen, 1992). En el macho reproductor, la producción de semen es directamente proporcional al tamaño testicular. El semen se guarda en los compartimientos extragonadales del epidídimo y el conducto deferente (Cunningham, 1999; Davol, 2001).

La cantidad de semen reservada dependerá de la frecuencia e intervalos entre eyaculaciones. Subsecuentemente la eyaculación frecuente puede causar una reducción en el rendimiento del semen, ya que las reservas de semen se vacían según informes recibidos practicando una eyaculación por día, durante 5 a 7 días. Por consiguiente, una vez que se vacían reservas, el número de espermatozoides total sólo será representado por la producción diaria de semen por los testículos. Por ésta razón la recolección de semen se realiza cada dos días, para permitir que vuelva a tener reservas de espermatozoides (Daval, 2001).

Existen pocas pruebas a favor de que el eyaculado de un perro que realiza cubriciones de forma infrecuente contendrá un número elevado de espermatozoides anormales (Allen, 1992).

Por el contrario, los machos con alta demanda pueden experimentar fertilidad menos óptima en ciertos momentos a lo largo de sus años reproductores. La calidad del semen, por consiguiente, es afectada a menudo por factores como la edad, el grado de excitación, frecuencia de eyaculación, técnica de la colección y manejo de la muestra (Daval, 2001).

El ciclo de la espermatogénesis, es decir, desde la división del espermatogonia hasta la aparición del espermatozoide en el eyaculado, tarda 8 semanas; durante 2 de éstas semanas los espermatozoides maduran en el epidídimo (Allen, 1992).

5.1.2. Control de la temperatura

La espermatogénesis no puede producirse con la temperatura normal del organismo en la mayoría de los mamíferos. Los mecanismos que mantienen los testículos del perro más fríos que el resto del organismo según (Allen, 1992), (Cunningham, 1999) y (Davol, 2001) son:

- Los testículos se alojan fuera de la cavidad corporal en el saco escrotal.
- El músculo cremáster puede influir sobre la distancia que media entre el cuerpo y el testículo.
- El músculo dartos en la pared escrotal puede influir sobre el tamaño del escroto y, en consecuencia, sobre la posición de los testículos.
- La disposición de los vasos sanguíneos en el cordón espermático permite la refrigeración de la sangre arterial mediante el retomo sanguíneo en el plexo pampiniforme.

5.1.3. Transporte del semen

Los espermatozoides llegan inmaduros a la cabeza del epidídimo; presentan una gota de citoplasma residual en el cuello. Las células maduran durante su paso a lo largo del epidídimo que se debe posiblemente a la producción constante de más semen en el testículo. Al entrar en el conducto deferente la gota (perla) se mueve hacia el extremo distal de la pieza media o es expulsada del espermatozoide, que ahora se considera maduro (Allen, 1992).

Una vez maduros, los espermatozoides emigran de los testículos al epidídimo donde se almacenan. Un extremo del epidídimo se adelgaza en el conducto deferente, el tubo a través del cual el espermatozoide maduro pasa para dejar el escroto (Davol, 2001).

5.1.4. Erección

La erección es un acontecimiento psicosomático en el que intervienen los sistemas vascular, neurológico y endocrino (Cunningham, 1999). Consiste en la tumescencia del pene como resultado de una acumulación de sangre en sus tejidos provocada por la constricción del retorno venoso (Allen, 1992; Cunningham, 1999). Los factores que estimulan la erección en la mayoría de los animales son el olor de una hembra en celo (estro) y la asociación entre rutina y coito, las vías mediante las que tales estímulos

Inician la erección son probablemente nerviosos, aunque no se conocen completamente (Allen, 1992).

Lo primero que aparece es un engrosamiento del bulbo del glande. Entonces el collar del glande se engruesa parcialmente. Este engrosamiento se propaga a todos los espacios cavernosos. Cuando el pene está completamente erecto, el epitelio está muy tenso y las venas superficiales son prominentes (Sisson *et al.*, 1993).

En los perros solamente se produce una ligera erección antes del coito; la penetración se ve favorecida por la rigidez del hueso peniano y la erección total se produce una vez que el pene ha sido introducido en la vagina de la perra (Allen, 1992), el bulbo del glande se alarga tanto que no puede ser retirado de la vagina (Allen, 1992; Sisson *et al.*, 1993); por tanto, el macho y la hembra quedan enlazados juntos durante 5 ó hasta 60 minutos (Sisson *et al.*, 1993).

Sólo después de disminuir la erección puede separarse el macho de la hembra (Allen, 1992). La erección disminuye porque después de la eyaculación se produce un aumento en el tono del músculo liso mediado por el nervio simpático a nivel sacro, aumentando la salida de sangre de los espacios cavernosos, además de producir una contracción del músculo retractor del pene que retira el pene hacia el interior del prepucio (Cunningham, 1999), en el perro la detumescencia del bulbo, ocurre antes que en la corona y en el collar del pene (Sisson *et al.*, 1993).

5.1.5. Eyaculación

Las contracciones del músculo uretral impulsan los fluidos procedentes de los conductos deferentes y de la próstata hacia la uretra (Allen, 1992).

Es decir durante la eyaculación, el espermatozoide se arrastrará del epidídimo a través del conducto deferente y se combinará con líquido seminal, secretado por la glándula de la próstata, en la uretra de la próstata antes de expelerse (Davol, 2001). El perro eyaculará el semen en tres fragmentos (Allen, 1992; Davol, 2001).

Primera fracción:

La primera fracción del eyaculado es la fracción pre espermática que es un volumen pequeño de fluido claro (Davol, 2001) que se elimina durante la excitación sexual inicial. Su volumen es variable aunque generalmente es de unos 0,5 ml. Puede ser eyaculada mientras el perro está empujando al intentar introducir su pene en la vagina de la perra, o puede ser expulsada tras la penetración. Procede de la próstata y su función puede ser la de lavar la vagina de restos de orina (Allen, 1992).

Segunda fracción

La segunda fracción es eyaculada generalmente después de la penetración, cuando el macho deja de empujar (Allen, 1992), sin embargo hay quien afirma que durante la eyaculación de este segundo fragmento, el perro empujará vigorosamente (Davol, 2001). Esta porción del eyaculado es rica en espermatozoides y su volumen suele ser de 0,5 a 1 ml. (Allen, 1992; Davol, 2001). Procede de los conductos deferentes y es depositada en la mitad anterior de la vagina al completarse la erección del pene (Allen, 1992). Durante y poco después de la eyaculación de esta fracción, el perro desea instintivamente girar, e incluso intentará caminar encima del brazo de la persona que realiza la recolección si se está realizando la recolección de semen por medio de una vagina artificial (Allen, 1992; Davol, 2001).

Tercera fracción:

La tercera fracción procede de la próstata, suele ser expulsada mientras los perros permanecen en pie, grupa con grupa y unidos (Allen, 1992; Davol, 2001). Su volumen puede ser de 15 a 20 ml. en razas grandes y depende probablemente del tiempo que permanecen unidos. La función de la tercera fracción del eyaculado consiste probablemente en arrastrar a la segunda fracción, rica en espermatozoides, desde la vagina craneal hacia el útero de la perra (Allen, 1992), sin embargo, no siempre es favorable el efecto de la tercera fracción sobre los espermatozoides ya que se trata de fluido prostático (Daval, 2001). Al final de la eyaculación se produce la desinflamación del pene y su retirada de la vagina (Allen, 1992).

VI. CARACTERÍSTICA DEL SEMEN FRESCO vs. REFRIGERADO

6.1 Semen fresco vs. Refrigerado

6.1.1. Semen fresco

Solamente se utiliza la segunda fracción (rica en espermatozoides); la misma se recoge en forma independiente (Allen, 1992). La recolección de la fracción espermática es suficiente para realizar la IA, parte de la fracción prostática puede recolectarse sólo para asegurarse que se ha recolectado toda la segunda fracción. Si el volumen de la fracción espermática es escaso, La fracción prostática puede servir para aumentarlo y facilitar el manejo del semen (Stornelli et al., 2006).

Para cada inseminación se utiliza un eyaculado, es decir no constituye un procedimiento para aumentar el número de perras inseminadas (Allen, 1992). La inseminación deberá efectuarse en un plazo no mayor a 15 minutos (Allen, 1992; Esquivel ,2002).

El semen fresco usado en intervalos de inseminación de 48 horas se ha demostrado favorable, considerando que con semen conservado el intervalo de la inseminación no debe exceder 24 horas (Gunzel, 1986).

La tasa de gestación obtenida con el semen fresco es 60% aproximadamente (Allen, 1992, Esquivel, 2002). Con el semen refrigerado disminuye notablemente este porcentaje y el tamaño de camada es 21.5% más pequeño en perras inseminadas con semen fresco, comparando con perras naturalmente apareadas (Linde-Forsberg y Forsberg, 1989).

6.1.2. SEMEN REFRIGERADO

Se ha hecho común enviar el semen en lugar de la perra. Los criadores han escogido la utilización del semen refrigerado por inseminación intrauterina para sus perras, en espera de buenas proporciones de preñez (Hutchinson, 2001).

Mediante el agregado de diluyentes, el semen puede ser refrigerado y de esta manera conservado y transportado. Las bajas temperaturas disminuyen las tasas metabólicas de los espermatozoides y prolongan su longevidad. Los diluyentes protegen a las membranas del espermatozoide del daño causado por los cambios de temperatura, proveen energía y mantienen estables el pH y la osmolaridad. Los antibióticos agregados a los diluyentes evitan la proliferación bacteriana, en especial en los que contienen yema de huevo (Stornelli et al., 2006). Sin embargo, el refrigerar el semen produce un aumento inmediato en el número de anomalías del cromosoma y una disminución subsecuente en la en la viabilidad del semen (Burgess et al., 2001).

Las tasas de preñez obtenidas utilizando semen refrigerado son de 50-60% (W. Edward, 1992). Según (Linde-Forsberg, 2000) la tasa de parición con este mismo semen es de 45.1% y el tamaño de camada es de 5.8+/-3.

VII.- OBJETIVOS

- Refrigerar semen canino, utilizando el diluyente CaniPROChill 5.
- Modificar la técnica recomendada por el laboratorio del producto.
- Evaluar la motilidad y viabilidad del semen canino refrigerado.

VIII.- HIPÓTESIS

- Con la modificación de la técnica del diluyente CaniPROChill 5, se conservara la motilidad y las características microscópicas del semen una vez procesado.
- Con la modificación de la técnica del diluyente CaniPROChill 5, NO conservara la motilidad y las características microscópicas del semen una vez procesado (Hipótesis Nula).

IX. MATERIAL Y METODOS

El trabajo fue realizado en el Hospital veterinario de Pequeñas Especies de la UAAAN UL, en la Ciudad de Torreón Coahuila; para determinar la motilidad progresiva del semen canino refrigerado a los días 5, 7, 9 utilizando el extender CaniproChill 5. El semen se recolecto por masturbación del perro en un piso no resbaladizo, a fin de facilitar la eyaculación, tomando en cuenta el menor número de personas para evitar estrés del canino. La recolección de realizo por la mañana con una temperatura de 28 °c. Para este trabajo de investigación se ocuparon 5 machos de diferentes; edades, pesos y razas, clínicamente sanos.

La motilidad espermática se evalúa antes y después de la criopreservación durante el periodo de los días antes mencionados. Los espermatozoides necesitan

ser motiles y capaces de sufrir cambios para lograr alcanzar y penetrar las capas que rodean al ovocito cuando ambas células se encuentran en el oviducto.

Material utilizado para la Toma y procesamiento de la muestra del semen:

CaniproChill 5.

- Guantes látex
- Microscopio.
- Vaso de precipitado
- Matraz Erlenmeyer
- Pipeta de tomas.
- Cámara de newbauer.
- Pipetas.
- Porta objetos
- Cubre objetos
- Centrifuga.
- Pajillas de .5 ml.
- Refrigerador.
- Cerrillos o encendedor

Evaluación del macho: En los perros se realizó un examen andrológico completo, para así saber si los machos se encontraban en óptimas condiciones para su reproducción (Feldman y Nelson, 1996).

Protocolo para CaniPROChill 5 medio de cultivo de refrigeracionpara el semen canino (13574/0110)

Preparación de la muestra

1. Atemperar elCaniPROChill 5.
2. Colectar la muestra de Semen canino.

a) Se utilizala segunda fracción del eyaculado que es, la rica en células espermáticas.

- Metodología

3.- Después de la recolección evaluar la calidad seminal (concentración, motilidad, morfología).

4.- Diluir una parte de semen de en una parte de la solución CaniPROChill

5.

Tabla 1. Dilución de semen por ml de CaniPROChill 5

Concentración semen canino (10^6)	Proporción de semen para extender
250-750	1 a 3
750-1.25	1 a 4
por encima de 1.25	1 a 5

Se puede conservar el semen durante un máximo de 5 días a 4 °C (39 °F) con la preservación de un mínimo del 70% motilidad inicial. Evitar que se produzcan cambios en la temperatura de conservación que consiste en colocar el tubo con el semen diluido en pequeño baño de agua.

En el momento de la inseminación se calienta el semen a temperatura ambiente y se realiza una evaluación de motilidad (véase instrucciones más abajo).

A los efectos del transporte marítimo semen refrigerado –se almacena esperma diluido a temperatura de 4 °C (39 °F) durante al menos 2 horas antes de embalaje y envío.

Realizar una evaluación de la motilidad antes de su envío y retener a una parte alícuota de control para la evaluación futura.

Si es necesario para alcanzar el volumen ideal de la inseminación (Vea las instrucciones de inseminación más abajo) agregar un poco de diluyente en el tubo de 13 ml extra en la caja de transporte canino.

Nota para el lavado de semen: Si la eyaculación recogida está contaminada con líquido de la próstata, lavar el semen con CaniPRO ApX2 Chill 5 por dilución de una parte del semen en 1 a 1 partes de la extensión (es decir, 1 ml de semen en 1ml de CaniPro ApX2 Chill 5) basado en la concentración. Centrifugar a 700 g durante 10-15 minutos. Después de la centrifugación, descartar el sobrenadante y lentamente volver a suspender el pellet de esperma en 1 parte de CaniPRO ApX2 Chill 5 (es decir, 1 ml de esperma precipitado en 1 ml de diluyente) basado en la concentración.

X.- RESULTADOS

Cabe mencionar, que el objetivo de esta investigación fue evaluar la motilidad y viabilidad del semen canino refrigerado; basándome en la modificación de la técnica recomendada por el laboratorio del producto utilizando el diluyente CaniPROChill 5, lo cual indico que el porcentaje de motilidad y viabilidad cuando se comparaban entre sí los diferentes ejemplares; la motilidad tenía un valor alrededor del 90% (rango individual: 80-95%) mientras que la viabilidad media era superior al 80% (rango individual: 80-95%). La media de morfoanomalías fue inferior al 6%.

Aunado a esto se realizó la modificación de la técnica tanto en la preparación del conjugado, ya que el laboratorio da especificaciones en promedio de uno a tres y el experimento dio resultados similares a los establecidos por el laboratorio.

En la tabla 2 .Animales utilizados en el experimento.

MACHO	RAZAS	EDAD
1	Dálmata	3
2	Labrador Golden	2
3	Pastor alemán	5
4	Viejo pastor ingles	3
5	San Bernardo	3

- a) Identificación del macho canino.

- b) Se puede observar que en la tabla 1, al evaluar el semen macro y microscópicamente de los animales en experimento, no hubo una diferencia significativa ($p < 0.05$), sin embargo, numéricamente sí.

Tabla 3. Comparación macroscópica y microscópica del semen obtenido.

VE= Volumen eyaculado **M=** Motilidad **V=** Viabilidad **MA=** Morfo anomalías

MACHO	V.E (ml)	Conc.x10⁶ ml	%M	%V	%MA
1	3	99	90	88	5.5
2	2.5	90	85	80	6.5
3	2.5	85	90	78	6
4	3.5	150	85	85	6
5	2	80	90	75	6
Media	2.5	90	90	80	6

El porcentaje de motilidad espermática (media) obtenido a lo largo del periodo experimental se expresa en la Tabla 3 con la utilización del Extender CaniPRO Chill5; la motilidad espermática se situó alrededor del 45.91-90.9% con un promedio del 70.79%, cabe mencionar que no existieron diferencias significativas dentro de cada macho a lo largo de todo el periodo experimental.

Tabla 4. Porcentaje de Motilidad Espermática (%ME) del inicio al final del experimento.

PERROS	% ME D1	% ME D2	% ME D3	% ME D4	% ME D5	% ME D6	% ME D7	% ME D8	% ME D9
1	88	88	80	80	70	95	50	55	65
2	85	80	70	70	60	90	45	50	60
3	90	88	75	75	65	92	45	50	60
4	85	80	70	70	60	90	45	50	55
5	88	78	70	70	60	88	45	50	60
MEDIA	85.46	82.57	72.79	72.79	62.75	90.9	45.91	50.92	59.83

Grafica 1. Porcentaje de Motilidad Espermática de la Media.





Figura 1. Media de la motilidad espermática en los 5,7,9 días.

Grafica 2. Porcentaje de motilidad espermatica por canino



XI. DISCUSIÓN

El trabajo experimental muestra los resultados de la motilidad espermática, obtenidos después de refrigerar y conservar el semen canino con el Extender CaniPROChill 5 durante los días 5, 7, 9, y se confirma los datos obtenidos en estudios realizados por otros autores, dichos resultados del estudio demuestran claramente que existen variaciones individuales no significativas en la calidad seminal post-refrigeración.

Existe un gran número de trabajos que han tratado de establecer la calidad del semen canino, antes y después de la refrigeración. La mayoría de esos trabajos de investigación han sido desarrollados utilizando machos de diferentes razas y sólo existen unos pocos trabajos donde la calidad seminal se ha definido en una raza en concreto. En nuestro estudio en fresco, los valores medios de motilidad y vitalidad eran similares o ligeramente superiores que los descritos para otras razas. Además, el número de morfoanomalías era inferior al 7%, siendo comparable con los resultados descritos por la mayoría de los autores. Sin embargo, la concentración seminal de nuestros machos (valor medio: 90×10^6 esp/ml) está dentro de los descritos en otros estudios.

La motilidad del semen refrigerado con el Extender CaniPROChill 5 oscilaba entre un 45-90% durante el periodo experimental, siendo nuestros resultados comparables a los obtenidos en otros trabajos que utilizan otras técnicas para refrigerar y conservar semen canino. Dentro de cada ejemplar, la motilidad espermática se modificaba muy ligeramente a lo largo del periodo experimental, indicando que este parámetro seminal permanece inalterable durante la refrigeración.

Con respecto a la viabilidad espermática, en la refrigeración, los valores medios de espermatozoides vivos eran prácticamente similares a los de otros autores. En la mayoría de estudios, tras la refrigeración, el porcentaje de viabilidad del semen

canino variaba entre 75 y 90%. Estos resultados indican que la variabilidad individual tiene menos influencia sobre el porcentaje de vitalidad post-refrigeración que en el porcentaje de motilidad. En la mayoría de los estudios, el porcentaje de morfoanomalías alcanza valores entre el 10-25% tras la refrigeración. En nuestro estudio, el porcentaje de morfoanomalías mostraba un valor medio de no más de 5 %.

En nuestro estudio, las características seminales en fresco fueron prácticamente similares entre todos los machos; sin embargo, tras el procesado y refrigeración seminal, se observaron diferencias en la calidad seminal entre machos, especialmente en la motilidad.

La motilidad progresiva es el parámetro más frecuentemente determinado para la evaluación de la calidad seminal del semen canino refrigerado. Además, otros estudios muestran una correlación positiva entre el porcentaje de motilidad progresiva y el porcentaje de morfoanomalías. Se puede afirmar que la motilidad podría ser un buen indicador de la calidad seminal post-refrigeración, y por tanto, ser un parámetro básico para determinar la capacidad fértil del semen canino tras la refrigeración.

Los resultados obtenidos en el estudio confirman que el uso de la modificación de la técnica de refrigeración utilizando el kit CaniPROChill 5, para conservar semen canino es de gran utilidad y nos permitió tener una motilidad buena lo que sugiero si la técnica se modificara los pasos en las instrucciones del extender CaniPROChill 5 se podrán obtener los mismo resultados o habrá alguna variación.

XII. CONCLUSIÓN

La utilización de diluyentes nos permite conservar el semen canino refrigerado logrando altos porcentajes de espermatozoides vivos con motilidad progresiva e integridad acrosómica.

Nos permite durante los días 5, 7, 9, el traslado de semen a diferentes puntos de nuestro país e incluso a países aledaños o cercanos. Esto evitará el traslado de animales para la realización de servicio natural, disminuyendo los costos, esfuerzo que esto implica.

En situaciones donde tenemos una cantidad muy limitada de semen, o no tenemos un número muy grande de dosis para inseminar, es muy importante planear una cría con una perra probada. Es mejor una perra que ha sido buena reproductora en el pasado. Lo que quiero decir; es que tenga ciclos estrales normales, concibe sin dificultad, y llega al término de la gestación sin complicaciones.

Todas las perras, primerizas o no, debe examinarse para: Brucella canis y micoplasma. Estas infecciones se transmiten durante el apareamiento y el contacto casual podría transmitir estas enfermedades de un animal a otro sin reproducirse.

XIII.-LITERATURA CITADA

1. Abusineina, M.E.: A study of the fern-like crystalline patterns of the cervical and vaginal mucus of cattle. Vet. Rec., 74: 619-621 (1962).
2. ALLEN, E. 1992 Fertility and obstetrics in the dog. Oxford (England): Blackwell Scientific publications limited. p. 1-175.
3. BROWN,R. M. 1992 An update of artificial insemination with fresh, chilled, and frozen semen. Problvetmed. 4(3):p. 445-52.
4. Concannon P.W., England G., Verstegen J. and Linde-Forsbers.2001.Usos de kits comerciales para ensayos de hormona luteinizante y de progesterona en el manejo reproductivo canino
5. DAVOL, P. A. 2000. Canine Reproduction. Part 1: Reproduction and the male dog.<http://www.labbies.com/reproduction4.htm>. (consulta: 10 de agosto 2004).
6. Desachy Forense; 2000, La reproducción del perro; primer edición; editorial Vecchi.
7. ESQUIVEL ,L. C. 2002 Reproducción en pequeñas especies. Memoria de la XII de ciencia Animal; 2002 28 Octubre- 2 de Noviembre; Torreón Coahuila. México. Formato electrónico.
8. EDWARD C, Feldman, Richard w, Nelson; 2000 ; Endocrinología y reproducción en perros y gatos; segunda edición, editorial McGraw- Hill interamericana.
9. FARSTAD, W. 2000. Assisted reproductive technology in canido species. Theriogenology, 53 (1): p.175-86.
10. FOSTER, R. Y M. Smith. 2001. Artificial Insemination (AI). PetEducation.<http://www.peteducation.com/repro/AI.htm>

11. GUNZEL, A. R. 1986. Sperm collection, evaluation, preservation and artificial insemination in the dog. *Tierarztlprax*, 14(2):p.275-82.
12. Foulkes JA. The separation of lipoproteins from egg yolk and their effect on the motility and integrity of bovine spermatozoa. *J. Reprod. Fert.* 1977; 49:277-284.
13. HEAPE, W. 1897. Artificial insemination of mammals and the subsequent fertilization or impregnation of their ova. *Proc Royal Soc. London*: 61: 52-56.
14. HUTCHISON, R. V. 2001. Canine Reproduction for Breeders, Seminar. Company at the 2001 Westminster kennel club show.
<http://www.amchessieclub.org/conception.html>
15. JHONSTON, D. J., M.V.R. Kuztritz y P. Olson. 2001. Canine and feline theriogenology. Philadelphia (United State) : Ed. Saunders. 16:287-306.
16. Luvoni GC. Current progress on assisted reproduction in dogs and cats: in vitro embryo production. *Reprod Nutr Develop.* 2000; 40:505-512.
17. MaybeMOM; TEST DE SALIVA. Consulta de internet.
http://www.maybemom.com/es/how_works
18. MC DONALD, 1975. *Veterinary Endocrinology and reproduction*. 2nd Ed. Lea and Febiger.
19. Mendoza C, Carreras A, Moos J, Tsarik J. Distinction between true acrosomal reaction and degenerative acrosome loss by one-step staining method using Pisum sativum agglutinin. *J. Reprod. Fert.* 1992;95:755-763.
20. MORTON, D.B. 1986. Review on the use of frozen semen in dog breeding. *Animal Technology*, 37(1):p.67-71.

21. NURIA DE BUEN DE ARGUERO. 2001. Citología diagnóstica veterinaria, Editorial Manual moderno.
22. PERÉZ, O. A. 2001. Historia Veterinaria: Verdades y mitos sobre lo que han hecho los veterinarios <http://www.visionveterinaria.com/historia/04dic2001.htm>.
23. PURSWELL, B. J. Y N. A. PARKER 2000. Modern breeding management in dogs. *Veterinary Medicine*. <http://www.hilltopanimalhospital.com/moder%20breeding%20management.htm>.
24. RUCKEBUSCH, Y., L. P. Phaneuf y R. Dunlop. 1991. Fisiología de pequeñas y grandes especies. México, D.F. El manual Moderno, S.A. de C.V. P.609-16.
25. SACHEZ, A. 1998. INSEMINACION ARTIFICIAL EN PERROS. IV Curso internacional de medicina y cirugía en pequeños animales. MEVEPA V Región- Universidad de Chile. Concon, Chile, pp.122-131.
26. SÁNCHEZ, A. 2000. Examen clínico reproductivo en la perra doméstica, Curso Tópicos en reproducción de pequeños animales. Universidad de Chile. Santiago, Chile, pp. 60-66.
27. SISSON, S., J. D. Grossman y R. Getty. 1993. Anatomía de los animales domésticos. 5 Ed. Tomo II, México: Salvat. P. 1728-41..
28. Stornelli MA, Stornelli MC, Arauz MS, de la Sota RL Inseminación con semen fresco, refrigerado y congelado. Aplicación y desarrollo en caninos. *Analecta Veterinaria*. 2001,21(1): 58-66.
29. STORNELLI, M. A., y L. Sota. 2007. Inseminación artificial con semen fresco, refrigerado y congelado. Aplicación y desarrollo en caninos. *ANALECTA VETERINARIA*, 21,1: p.1728-41.
30. VEGA GORDO, L; Matas parra, C., 1998 Tecnología de la inseminación artificial en caninos.