

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
UNIDAD LAGUNA**

DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL



**TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN
CANINOS Y FELINOS**

POR

ROSA ESTELA AGUIRRE CARRILLO

MONOGRAFIA

**PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA
OBTENER EL TÍTULO DE**

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

Torreón, Coahuila, México

Marzo del 2009

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
“ANTONIO NARRO”
UNIDAD LAGUNA**

DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL



**TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN
CANINOS Y FELINOS**

MONOGRAFIA

POR:

ROSA ESTELA AGUIRRE CARRILLO

ASESOR PRINCIPAL:

M.C. JOSÉ LUIS FCO. SANDOVAL ELIAS

Torreón, Coahuila, México

Marzo del 2009

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
"ANTONIO NARRO"
UNIDAD LAGUNA**

DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL



**TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN
CANINOS Y FELINOS**

MONOGRAFIA POR:

ROSA ESTELA AGUIRRE CARRILLO

ASESOR PRINCIPAL



M.C. JOSÉ LUIS FCO. SANDOVAL ELIAS

Torreón, Coahuila, México

Marzo del 2009

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
"ANTONIO NARRO"
UNIDAD LAGUNA**

DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL

**TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN
CANINOS Y FELINOS**

MONOGRAFIA POR:

ROSA ESTELA AGUIRRE CARRILLO

ASESOR PRINCIPAL



M.C. JOSÉ LUIS FCO. SANDOVAL ELÍAS

**COORDINADOR DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA
ANIMAL**



M.C. JOSÉ LUIS FCO. SANDOVAL ELÍAS



**COORDINACION DE LA DIVISION
REGIONAL
CIENCIA ANIMAL**


Torreón, Coahuila, México

Marzo del 2009

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
"ANTONIO NARRO"
UNIDAD LAGUNA**

DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL

Presidente del jurado



M.C. JOSÉ LUIS FCO. SANDOVAL ELIAS

Vocal




M.V.Z. RODRIGO ISIDRO SIMÓN ALONSO

Vocal



I.Z. JORGE HORACIO BORUNDA RAMOS

Vocal Suplente



M.V.Z. JESÚS ALFONSO AMAYA GONZÁLEZ

Torreón, Coahuila, México

Marzo del 2009

AGRADECIMIENTOS

A Dios que me ha dado la hermosa oportunidad de cumplir uno de mis sueños
Que me ha permitido llegar hasta aquí con una vida plena.

A mis hijos por su amor y comprensión.

A mi familia que siempre me ha apoyado incondicionalmente en todo momento, por
Su cariño y amor.

A mis maestros y amigos, que siempre me han demostrado su cariño, y apoyo en
todo momento.

DEDICATORIAS

A MIS HIJOS.

Rafael y Alejandra, que son mi más grande tesoro y el motor que me inspira a seguir adelante cada día.

A MI MADRE.

Luz Maria, por su paciencia y gran amor, no es fácil tener una hija como yo.

A MI ASESOR.

MC. José Luis Fco. Sandoval Elias, por todo su apoyo para poder obtener el Título de Medico Veterinario Zootecnista, mil gracias.

INDICE GENERAL

	PAG.
AGRADECIMIENTOS	I
DEDICATORIA	II
INTRODUCCION	III
.	
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN CANINOS Y FELINOS	1
COMPORTAMIENTO NATURAL CANINO	2
AGRESIÓN DE DOMINANCIA	
COMPORTAMIENTO CANINO AGRESIVO	
AGRESIVIDAD RELACIONADA AL MIEDO	4
AGRESIVIDAD PREDATORIA.	
AGRESIVIDAD TERRITORIAL	5
EL PERRO ENSUCIANDO LA CASA	6
EVALUACIÓN RELACIONADA CON ANSIEDAD	7
SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA.	
MICCIÓN DEBIDA A EXCITACIÓN	8
FALLO DEL CONTROL DE EVACUACIÓN EN LA CASA	9
MICCIÓN POR SUMISIÓN	
MARCADO DE ORINA	10
COMPORTAMIENTO CANINO DESTRUCTIVO	
ESCARBADO	11
MORDISQUEO	13
COMPORTAMIENTO CANINO MOLESTO	14
LADRIDOS	
PEDIR, DAR LA PATA, EMPUJAR	
COPROFAGÍA	15
SALTOS	16
MONTA	17
CALLEJEO	
ANSIEDAD CANINA	18
FOBIAS AL RUIDO	
ANSIEDAD DE SEPARACIÓN	19
COMPORTAMIENTO NATURAL FELINO	21
CONDUCTA ALTERADA EN GATOS	
EL GATO ENSUCIANDO LA CASA	22
COMPORTAMIENTO DE MARCADO	23

ELIMINACIÓN INADECUADA	25
DIFERENCIACIÓN ENTRE LA MICCIÓN INADECUADA Y EL MARCADO CON ORINA	26
COMPORTAMIENTO FELINO AGRESIVO AGRESIÓN DEBIDA A LA POSICIÓN JERARQUICA SOCIAL	27
AGRESIÓN PROVOCADA POR ACARICIAMIENTO	28
AGRESIÓN RELACIONADA AL JUEGO.	29
AGRESIÓN PREDATORIA	30
AGRESIÓN REDIRIGIDA	
AGRESIÓN TERRITORIAL	31
COMPORTAMIENTO FELINO DESTRUCTIVO	
MORDISQUEO	32
INGESTIÓN DE PLANTAS CASERAS	33
ARAÑADOS	34
BIBLIOGRAFIA	36

RESUMEN

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN CANINOS Y FELINOS

Tesista: Rosa Estela Aguirre Carrillo

En este trabajo se abordan estudios realizados sobre los trastornos de la conducta en caninos y felinos, ya que muchos cambios conductuales son debidos a la mala influencia de los dueños, por hacerlos comportarse como humanos, dejando a un lado la naturaleza propia de perro o el gato. Las cosas serian diferentes si entendiéramos más acerca de la etología propia de la especie, así como del instinto propio de los animales. Para poder hablar de los trastornos de comportamiento de los perros y gatos adultos, es necesario tratar antes, del desarrollo del cachorro. Las causas de los trastornos del comportamiento, pueden ser debidas a desórdenes ocurridos en el entorno del cachorro, o traumas sufridos en los primeros días de su vida. Para que un cachorro se convierta en un adulto equilibrado, es necesario que pase por una serie de etapas que son indispensables para alcanzar ese equilibrio. La intención principal del estudio abarca desde la identificación de problema de conducta hasta su manera de resolverlo.

Palabras Clave.- Trastorno, Etología, Conducta, Canino, Felino.

INTRODUCCION

Para poder hablar de los trastornos de comportamiento de un perro adulto, es necesario tratar antes, del desarrollo del cachorro. Las causas de los trastornos del comportamiento, pueden ser debidas a desórdenes ocurridos en el entorno del cachorro, o traumas sufridos en los primeros días de su vida. Para que un cachorro se convierta en un adulto equilibrado, es necesario que pase por una serie de etapas que son indispensables para alcanzar ese equilibrio.

En estado natural, la madre sabe instintivamente lo que conviene hacer, sabe cuando el cachorro necesita protección, y cuando hay que rechazarlo. El pequeño adquiere su autonomía poco a poco, y la madre proporciona las bases necesarias para su supervivencia futura. Cuando interviene el hombre, la situación cambia, introduciendo factores que pueden mejorar o empeorar la personalidad del animal. Si la persona que cría el cachorro desde que nace, no conoce los estadios por los que éste tiene que pasar, puede destruir determinadas relaciones, dando lugar a alteraciones y desequilibrios.

Ciertamente, hay comportamientos que son innatos y otros adquiridos, y aún cuando el propietario, no puede modificar una predisposición genética, si puede manejar la influencia ejercida por el medio exterior en las diferentes etapas del desarrollo del cachorro.

En la comunicación del perro con sus congéneres y con el hombre, juegan primordial importancia dos conceptos: socialización y jerarquización. La comunicación es la base de una vida social equilibrada, que unida a la socialización, puestas al servicio de la educación, permiten contar con un perro de gran calidad y equilibrado, que son el único secreto para la prevención de comportamientos indeseados.

Un perro no puede ser equilibrado si no encuentra satisfechas sus necesidades psicológicas y físicas, lo cual sólo puede lograrse conociendo las etapas del desarrollo del cachorro y conociendo sus miedos. Los problemas que causan más molestias a los propios dueños son los excrementos, los ladridos, la agresividad, los saltos encima de las personas, la excitación sexual, la

Un aspecto de suma importancia, es la elección de la raza, antes de adquirir el cachorro, y conocer las características genéticas propias de esa raza, pues como se ha expresado, estas no son modificables. Un perro cuya raza requiere de autoridad, no puede estar en manos de un propietario débil, pues el dueño debe estar capacitado para dar al perro la educación en función de su carácter. El dueño debe aprender a observar al perro, imponerle límites, pero respetando su condición de perro.

Los trastornos de comportamiento no son fáciles de resolver, ni son para ser resueltos por un "buen" entrenador, pero si pueden ser solucionables, con la reeducación adecuada. Para no llegar a esta necesidad de reeducar a nuestro perro, lo mas importante es la prevención, que pasa por elegir la raza adecuada, educar al cachorro teniendo en cuenta su carácter, y finalmente por proporcionarle una vida equilibrada .

La conducta social del gato ha sido ampliamente estudiada en diversos colectivos, tanto en animales asilvestrados como en animales que conviven con el hombre, y lo cierto es que presentan grandes variaciones. Un parámetro que al parecer es de suma importancia para que desarrollen unas u otras conductas es la disponibilidad de alimento. Las diferencias genéticas se muestran al parecer importantes en cuanto a la organización social de estos animales, así como las experiencias tempranas durante su desarrollo.

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN CANINOS Y FELINOS

COMPORTAMIENTO CANINO AGRESIVO

El comportamiento agresivo canino constituye la queja más comúnmente presentada a los especialistas del comportamiento. De todos los posibles problemas de conducta, la agresión generalmente es la más desconcertante y peligrosa. El comportamiento agresivo que manifiesta un perro, generalmente es un comportamiento canino normal. Sin embargo, cuando los perros viven con seres humanos, la agresión es casi siempre inaceptable.

La agresión es una acción dañina o de amenaza, dirigida a uno o más individuos. El motivo de la agresión puede variar ampliamente. La clave para diagnosticar y tratar correctamente la agresión reside en descubrir el motivo originario de la misma.

AGRESIÓN DE DOMINANCIA.

Descripción: La agresión de dominancia frecuentemente se asocia con la adquisición o mantenimiento del acceso a un recurso valioso. El perro usa la agresión para controlar objetos o interacciones. El objeto de la agresión está generalmente envuelto en algún tipo de interacción con el perro que desencadena el comportamiento agresivo dominante. La agresión de dominancia se desencadena frecuentemente en las siguientes situaciones.

- El perro está protegido comida o ciertos objetos (juguetes, objetos sustraídos).
- El perro es perturbado mientras duerme o descansa.
- El dueño intenta llevar al perro por el collar.
- El perro está siendo sometido a disciplina.
- El perro está recibiendo cuidados higiénicos.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

Un perro exhibiendo agresión de dominancia puede parecer muy ofensivo o “**dominante**” en su comportamiento (ej. Mirada fija e intensa, gruñido mostrado o no los dientes piloerección, rabo en alto con movimientos tensos y rápidos) o el perro puede mostrar señales ambivalentes de comportamientos dominantes y también de sumisión.

Objeto: Generalmente miembros de la familia, gente conocida, u otros perros.

Edad de aparición: Generalmente entre uno y tres años de edad.

Tratamiento:

De la agresión por dominancia a humanos.

- Realice entrenamientos de obediencia.
- Castre machos intactos.
- Someta a un programa de cesión básica.
- Evite inicialmente los estímulos que provocan respuestas agresivas.
- Cuando el dueño comience a sentirse con más confianza y el perro está cediendo, el dueño puede empezar la desensibilización sistemática y el contracondicionamiento para manejar las situaciones desencadenantes de agresión.
- No permita al perro el uso de sillones u otros muebles.
- Elimine los juegos competitivos o de agresión como luchas, juegos de la cuerda.
- Ponga el animal en aislamiento social por comportamiento agresivo, si puede hacerlo sin peligro.
- Considere poner al perro el arnés de cabeza con la correa colgando para obtener mayor control, de ser necesario.
- La terapia farmacológica puede ayudar si existe un componente implícito de ansiedad en el comportamiento agresivo.

*Una confrontación directa donde el dueño intenta controlar físicamente al perro (echarlo al suelo, sujetarlo por el bozal) cuando el perro está exhibiendo agresividad, **NO** es recomendable pues tiene poco éxito y es potencialmente peligroso.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

Agresividad de dominancia entre perros que conviven.

- Elimine el estímulo que provoca la agresión (ej. golosina de larga duración), de ser posible.
- Identifique y muestre predilección hacia el perro dominante.
- Regañe al perro subordinado al manifestar conductas que pueden provocar agresión.
- Si la agresión es severa, manténgalos separados y gradualmente reintrodúzcalos usando bozales y correas cuando sea necesario.
- Identifique métodos “seguros” para los dueños de parar las peleas (ej. Cornetas, agua).

AGRESIVIDAD RELACIONADA AL MIEDO.

Descripción: Los perros que manifiestan agresividad relacionada al miedo tienden a mostrar este comportamiento ante ciertas personas o estímulos (ej. Hombres, niños, veterinarios, perros desconocidos). El miedo puede ser debido a predisposición genética, falta de socialización o una experiencia negativa. A menudo, el perro muestra signos de conducta de huida o miedo antes de manifestar agresividad. Cuando un perro asustado se ve acorralado, probablemente morderá. Los perros con agresividad relacionada al miedo, a menudo muestran signos ambivalentes de miedo, sumisión y agresividad ofensiva.

Objeto: Estímulos específicos.- Los hombres y otros perros.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Utilice desensibilización sistemática para los estímulos que evocan miedo, y contracondicionamiento.
- Los arneses de cabeza pueden ser útiles en el entrenamiento.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- La terapia farmacológica puede ser útil para disminuir la ansiedad pero deberá usarse con precaución si la dominancia es parte del problema.

AGRESIVIDAD PREDATORIA.

Descripción: La predación es un comportamiento instintivo en los perros y comprende el acecho, persecución, captura, mordida, matanza e ingestión de la presa. Vocalización generalmente no forma parte de la secuencia predatoria. Muchos perros domésticos manifiestan expresiones simplificadas del comportamiento predatorio (ej. Persiguen pero no muerden). Algunos perros, sin embargo, poseen una fuerte inclinación predatoria y pueden matar animales pequeños o niños. Generalmente, el pronóstico no es bueno en la agresividad predatoria. Un control del perro, para prevenir acceso a la presa, es obligatorio.

Objetivo: Pequeños animales, niños y ancianos.

Edad de aparición: No relacionado con la edad.

Tratamiento:

- Confinamiento y control mediante correa/arnés de cabeza.
- Desensibilización sistemática y contracondicionamiento.
- Corrección a distancia.
- Traslado a un hogar diferente o eutanasia si el control del animal es imposible o existe riesgo para niños u otros animales de compañía.

AGRESIVIDAD TERRITORIAL.

Descripción: Los perros que manifiestan agresividad territorial, generalmente responden agresivamente a personas o animales desconocidos que se acerquen a su territorio. La casa,

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

el jardín y el coche, tienden a ser las áreas donde la agresividad territorial es más acentuada. La agresividad es, con frecuencia, recompensada por que el objeto de la agresividad es efectivamente “**ahuyentado**”. A menudo esto no es un resultado directo de la agresión; el individuo podía estar de paso o entregando el correo.

Los perros que exhiben agresividad territorial, generalmente muestran signos diseñados para aumentar la distancia entre ellos y el intruso. Estos incluyen posturas corporales que aumentan su tamaño aparente, incluyendo piloerección y extensión corporal, orejas tiesas y el rabo mantenido en posición vertical. También pueden gruñir mostrando o no los dientes, ladrar, atacar, lanzar bocados, y morder.

Objeto: Personas o animales desconocidos.

Edad de aparición: Generalmente tras la madurez sexual (1 a 3 años de edad).

Tratamiento:

- Elimine las posibilidades de que el perro ahuyente con éxito los intrusos (esto incluye la agresión dirigida hacia intrusos de paso).
- Desensibilización sistemática y contracondicionamiento a la llegada de visitantes y a estímulos específicos asociados con su llegada. (ej. Cuando suena el timbre).
- El arnés de cabeza puede ayudar a obtener buen comportamiento.
- Ponga el perro en aislamiento social por comportamiento agresivo.
- Aunque se alcance éxito en los ejercicios de desensibilización sistemática y contracondicionamiento, los perros que han manifestado agresividad territorial, deben ser confinados adecuadamente para que no tengan la oportunidad de causar daño a otras personas.

EL PERRO ENSUCIANDO LA CASA.

El problema de ensuciar en casa puede aparecer en perros de cualquier edad pero hay una mayor incidencia en los jóvenes y en los perros viejos. Como con cualquier otro problema que se nos presente, es importante adquirir un historial completo acerca del problema de ensuciado en casa. Una amplia gama de problemas médicos pueden contribuir a ello incluyendo enfermedades causantes de poliuria-polidipsia, enfermedades del tracto urinario, malformaciones congénitas, problemas neurológicos, artritis o senilidad.

Una investigación médica debería incluir.

- Exámenes físicos.
- Análisis de orina vía cistocentesis o análisis de heces.
- Si es necesario, otras pruebas de laboratorio, radiografías, ultrasonidos.

Una vez eliminados los problemas médicos, los siguientes problemas de comportamiento deben considerarse.

Muchos problemas de eliminación están ligados a una alteración en la función del tracto gastrointestinal. Un perro con molestias gastrointestinales o indigestión, no siempre puede evitar ensuciar la casa, aún con las mejores intenciones. Para que cualquier plan de entrenar al animal a que controle sus necesidades en la casa tenga éxito, hay que establecer un óptimo estado de salud del intestino.

EVALUACIÓN RELACIONADA CON ANSIEDAD

Descripción: Cuando los perros sufren miedo extremo, pueden orinarse, defecar o vaciar los sacos anales. Uno de los signos clínicos frecuentes en la ansiedad debido a separación es la evacuación mientras los dueños están ausentes. Si el miedo o la tensión nerviosa es el factor causante de la eliminación, debería haber otros signos tales como jadeo, nervioso ir y venir, destrucción, actitud de fuga o vocalización.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

Edad de aparición: No relacionado con la edad.

Tratamiento:

- Identificar los estímulos que provocan la ansiedad.
- Establecer ejercicios de desensibilización sistemática y contracondicionamiento de los estímulos que provocan el miedo.
- Terapia médica para disminuir la ansiedad puede ser de ayuda.

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA.

Descripción: La pérdida del control en la eliminación puede ser uno de los signos clínicos asociados con el síndrome de disfunción cognitiva (senilidad). Otros síntomas del síndrome de disfunción cognitiva incluyen desorientación, cambios en el ciclo sueño – vigilia y cambios en las interacciones sociales.

Edad de aparición: Perros mayores, 7 años de edad.

Tratamiento:

- Siga las sugerencias de tratamiento para los perros que no han recibido entrenamiento en hábitos higiénicos o que se les haya suspendido el mismo (ver más abajo).
- Administre tratamientos farmacológicos.

MICCIÓN DEBIDA A EXCITACIÓN.

Descripción: En situaciones de mucha excitación, el perro puede gotear o expulsar pequeñas cantidades de orina. Esta conducta es más probable que ocurra en perros jóvenes y suele desaparecer con la edad sin tratamiento específico.

Edad de aparición: Generalmente, cachorros o perros jóvenes (de 1 a 7 meses de edad) pero puede ocurrir a cualquier edad.

Tratamiento:

- Disminuya el nivel de excitación en situaciones que conducen a la micción por excitación (ej. Durante el recibimiento, ignore al perro).
- Desensibilización sistemática a las situaciones que provocan excitación.
- Contracondicione al perro para dirigirlo a otra actividad cuando se excite.
- Terapia médica, para aumentar el tono del esfínter urinario, puede ser de ayuda.

FALLO DEL CONTROL DE EVACUACIÓN EN LA CASA.

Descripción: Un perro que no esté entrenado en el control de evacuación en casa o que tenga un fallo en el mismo, orinará y/o defecará en la casa independientemente de la presencia o ausencia del dueño. Algunos perros aprenden a evitar la eliminación directamente delante del dueño si previamente se les ha castigado por esa conducta. Los perros pueden encontrar lugares en el interior más asequibles o atractivos. A menudo tienen un substrato o un lugar preferido para la eliminación dentro de la casa. Un clima tormentoso puede contribuir al desarrollo del problema.

Edad de aparición: Generalmente cachorritos (2 a 6 meses de edad) y perros mayores (7 años de edad) pero puede ocurrir a cualquier edad.

Tratamiento:

- Evite las oportunidades de eliminación en la casa mediante estrecha supervisión o confinamiento en un recinto a propósito.
- Acompañe al perro al exterior a un lugar apropiado para la eliminación varias veces al día, todos los días, saque al perro después de sus comidas, y después de dormir o jugar.
- Premie la eliminación en el exterior inmediatamente después de que ocurra, usando alabanzas y golosinas.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- Si se lo sorprende eliminando dentro de la casa, se puede asustar al perro (ruidosamente) y seguidamente sacarlo al exterior y alabarlo cuando termine sus necesidades fuera de la casa.
- Limpie las áreas ensuciadas en la casa con productos enzimáticos de venta en tiendas de animales de compañía.

MICCIÓN POR SUMISIÓN.

Descripción: Al intentar comunicar sumisión a una persona, y generalmente en asociación con un saludo o una reprimenda, el perro puede orinarse. El perro manifestará otras posturas corporales que expresan sumisión (ej. Orejas hacia atrás, evitación de la mirada, acobardamiento o echarse y rodar en el suelo). La micción de sumisión es más común en perras jóvenes. En la mayoría de los perros, esta conducta desaparece cuando cumplen un año de edad.

Edad de aparición: Generalmente cachorros o perros jóvenes (de 1 7 meses de edad) pero puede ocurrir a cualquier edad.

Tratamiento:

- Los dueños deben saludar al perro de manera menos amenazadora (arrodillados, con mirada indirecta, acariciándolo debajo del pecho en lugar de sobre la cabeza), o puede ser necesario ignorar al animal durante unos minutos.
- Los dueños pueden ocupar al perro en otra actividad incompatible con la micción cuando se sospecha que la micción debida a sumisión puede ocurrir (ej. Lanzando una pelota u ofreciendo al perro una golosina).
- Los dueños no deberán nunca castigar o reprender al perro por la micción de sumisión; esto solo empeoraría el problema.
- Terapia farmacológica para aumentar el tono del esfínter urinario podría contribuir en casos que no respondan a la modificación de la conducta.

MARCADO DE ORINA.

Descripción: El marcado con orina supone pequeñas cantidades de orina generalmente depositadas verticalmente sobre objetivos. El marcado con orina ocurre a pesar de que exista adecuado acceso al exterior. Desencadenantes del marcado con orina pueden incluir: la llegada de un nuevo animal de compañía, una perra en celo, o un nuevo artículo o persona en la casa. Los machos maduros sexualmente intactos son los que más frecuentemente manifiestan este comportamiento.

Edad de aparición: 6 a 24 meses de edad.

Tratamiento:

- Castrar perros machos intactos
- Limitar o prevenir la exposición a estímulos que desencadenan la conducta de marcado de orina
- Haga aversivos los objetos marcados.
- La corrección a distancia puede ser útil.

COMPORTAMIENTO CANINO DESTRUCTIVO.

Los comportamientos destructivos pueden dañar las propiedades, herir los animales de compañía y destruir los lazos de relación humano-animal. Puede existir una amplia variación de motivaciones para el comportamiento destructivo, y como en cualquier otro problema del comportamiento, debe hacerse una evaluación completa de la situación.

ESCARBADO.

Descripción: Hay muchas diferentes motivaciones para escarbar, que van desde el entretenimiento a la ansiedad. Obteniendo información acerca de este comportamiento se puede establecer su motivación. La tabla siguiente muestra algunas de las motivaciones y los pasos apropiados a tomar para resolver el problema del escarbado.

Edad de aparición: A menudo cachorros y perros jóvenes (2 a 12 meses) pero puede ocurrir a cualquier edad.

Tratamiento:

Ver tabla siguiente.

MOTIVACIONES DEL ESCARBADO	CARACTERISTICAS	SOLUCION
Regulación de la temperatura corporal	Los hoyos se hacen en áreas frescas y sombreadas, el perro descansa en los hoyos después de escarbarlos. perro descansa en los Hoyos después de escarbarlos	Proporcionar un área fresca que el perro pueda descansar.
Caza	Presencia de animales que habitan bajo tierra, es escarbado del perro refleja la actividad subterránea.	Elimina las criaturas subterráneas
Enterrando Objetos	El perro excava agujeros, entierra Objetos, y más tarde los recupera.	No de al perro objetos para enterrar O Provea lugares aceptables donde escavar O confíen al perro a un lugar donde escarbar sea imposible
Juegos	Perros muy activos que no tienen salida apropiada para su actividad.	Proporcione recursos alternativos para el juego.
Exploración	Agujeros escarbados al azar.	Aumente el ejercicio, proporcione mas áreas adecuadas para el escarbado O Confine al perro a un lugar donde escarbar sea imposible.
Comportamiento de Fuga	Agujeros localizados en los bordes, que limitan la propiedad	Identifique la motivación para la fuga (ej. Callejeo ansiedad) E implemente tratamiento adecuado.

MORDISQUEO.

Descripción: La mayoría de los comportamientos de mordisqueo están asociados con la exploración y juego de los cachorros. Puesto que el perro mayor es menos activo e inquisitivo, el mordisqueo destructivo a menudo disminuye con la edad. Los dueños pueden sin darse cuenta, crear un problema, al ofrecer al perro artículos para roer, que son, para el animal, indiferenciables de aquellos que no debe morder, por ejemplo, para el perro, un juguete de peluche puede ser muy similar a un cojín de sofá. Alternativas inadecuadas para el exceso de energía pueden también contribuir al comportamiento destructivo de mordisqueo. Un perro altamente energético que se deja solo durante horas y tiene escasas alternativas atractivas o aceptables para morder puede destruir otros objetos en el entorno.

Edad de aparición: Generalmente cachorros y perros jóvenes.

Tratamiento:

- Provea artículos apropiados para morder estos artículos deberían ser suficientemente diferentes de los objetos de la casa, de manera que el perro no confunda los objetos apropiados para morder, con los inapropiados; aumente su atractivo aplicándoles una capa de alimentos sabrosos.
- Proporcione alternativas apropiadas para ejercicio.
- Elimine el acceso a objetos de morder inaceptables retirándolos del entorno o aisle al perro de los objetos cuando no pueda supervisarlos.
- Cuando el perro parece interesado en morder un objeto inaceptable, sustitúyalo por un artículo apropiado.
- Alabe al perro por mordisquear los artículos apropiados.
- Si es necesario, ponga aversivos (ej. Manzana amarga) sobre los artículos inapropiados para prevenir el mordisqueo.
- Si es necesario, utilice corrección a distancia para el mordisqueo de objetos inadecuados.

Problemas Relacionados con la Ansiedad.

- Identifique el desencadenante y aplique desensibilización sistemática y contracondicionamiento.
- Administre terapia farmacológica de ser necesario.

COMPORTAMIENTO CANINO MOLESTO.

LADRIDOS.

Descripción: Ladrar forma parte de la comunicación canina. Ladrar demasiado puede ser un problema, especialmente en áreas urbanas. Los perros ladran debido a muchas y diferentes razones (ej. Saludo, juego, llamada, reunión, defensa, dolor y alarma). La motivación del comportamiento de ladrar debe determinarse antes de que se establezca un plan de tratamiento adecuado.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento: Ver la siguiente tabla

MOTIVACIONES DEL LADRIDO	CARACTERISTICAS	SOLUCION
Ladrado social	Los perros ladran en respuesta Al ladrado de otros perros o Como parte de un juego	Aumenta el juego no vocal (ej. busca y atrae) y el ejercicio; elimine estímulos del ladrado
Buscando atención	El perro recibe algo (ej. Atención, golosinas) al ladrar	Elimine cualquier recompensa que refuerce esta conducta
Relacionado con la Ansiedad	Estímulos específicos (ej. ruidos, separación del dueño) Desencadenan los ladridos	Identifique el desencadenante y realice desensibilización sistemáticas y Contra condicionamiento
Defensa territorial	Intrusos en el territorio o su Vecindad desencadenan los Ladridos	Bloquee el acceso visual/auditivo al estímulo; desensibilización sistemática y Contracondicionamiento.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

***Sobre los collares anti-ladridos.**

- Los collares anti-ladridos producen una forma de castigo se produce el ladrido. No deben usarse en perros que ladran debido a causas relacionadas con ansiedad.
- El collar de citronela emite un rocío inofensivo pero desagradable y puede usarse junto a otros tratamientos para casos de ladridos no relacionados con ansiedad.
- Otros collares anti-ladrido pueden ser de ayuda en algunos casos no relacionados con ansiedad, pero deberán usarse con supervisión y precaución.

PEDIR, DAR LA PATA, EMPUJAR.

Descripción: Muchos perros piden, dan la pata, o se arriman empujando a sus dueños para conseguir comida o atención. Estos comportamientos son generalmente conductas para llamar la atención que el dueño ha reforzado bien sea con comida o atención.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Asegúrese de que el perro posea opciones de juego y ejercicio adecuado.
- Elimine el comportamiento evitando todo reforzamiento de la conducta.
- El éxito del tratamiento puede obtenerse más rápidamente si el dueño se marcha como respuesta a la conducta inadecuada.
- Puede usarse corrección distancia.

COPROFAGÍA.

Descripción: Coprofagia se refiere a la ingestión de heces. Los perros jóvenes son los que más frecuentemente presentan esta forma de pica, pero puede presentarse en cualquier edad. Algunos perros consumen sus propias heces y otros comen las heces de otros perros o las de otras especies. Existen diferentes teorías sobre las causas del desarrollo de este

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

comportamiento, incluyendo comportamiento exploratorio, establecimiento de microflora intestinal, o compensando una deficiencia nutricional. Este comportamiento es en sí autocompensante y como tal puede fácilmente convertirse en un hábito difícil de erradicar.

Edad de aparición: Más común en cachorros y perros jóvenes pero puede ocurrir a cualquier edad.

Tratamiento:

- Examine posibles problemas médicos ocultos (ej. Deficiencias pancreáticas) o deficiencias de nutrición.
- Considere un cambio en la dieta que altere las características de las heces.
- Proporcione alternativas de juego y ejercicio.
- Evite el acceso a las heces.
- Aplique materiales aversivos (ej. Salsa picante) a las heces o añada sustancias a la comida del perro que le hagan sus heces menos atractivas (ej. glutamato monosódico)
- La corrección remota solo tendrá éxito si el dueño es constante, lo cual es prácticamente imposible en la coprofagia.

SALTOS.

Descripción: Los perros son animales sociales y a menudo saltan sobre la gente cuando están excitados, durante los reencuentros o en el juego y para recibir atención. Este comportamiento puede haberse originado de los lobos los cuales se lamen uno a otros en la cara cuando se saludan.

A menudo este comportamiento se considera aceptable cuando se trata de cachorros, pero cuando el animal madura, se torna en molesto e incluso peligroso. La gente refuerza el comportamiento al interactuar con el perro cuando éste les salta. La interacción puede ser

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

positiva, como acariciar al perro o puede ser negativa, como cuando empujamos al perro hacia abajo diciendo “no”. En cualquier caso el perro obtiene su objetivo de conseguir la atención de la persona.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Contracondicionamiento del perro para que manifieste un comportamiento alterno aceptable, tal como sentarse durante los saludos; si el perro se sienta, se le recompensará con alabanzas.
- Cuando el perro vaya a encontrar gente a la que pueda saltar, será conveniente colocar una correa y el arnés de cabeza sobre el perro de manera que el comportamiento de saltos pueda corregirse con un suave tirar de la correa hacia abajo. Siga esta acción dando al perro la orden correspondiente al comportamiento deseado para lo saludos (ej. siéntate, -sit- si queremos que se siente) y entonces permitimos que la persona salude al perro.
- Es muy importante eliminar cualquier refuerzo al comportamiento de saltos. Las personas deberán voltearse y alejarse del perro si salta sobre ellas; la orden para el comportamiento adecuado debe darse entonces y el perro recibirá las atenciones solamente cuando haya respondido a la orden.

MONTA.

Descripción: La monta puede estar motivada socialmente y sexualmente. En las casas donde los perros montan a sus dueños, puede haber un problema de control y puede ser indicativo de un problema de dominancia. Dicha conducta también puede ser un comportamiento en busca de atención.

Edad de aparición: A menudo empieza en cachorros pero su frecuencia aumenta con la madurez sexual (6 a 15 meses de edad).

Tratamiento:

- Castrar perros machos enteros.
- Iniciar un programa básico de cesión.
- Eliminar cualquier reforzamiento del comportamiento de monta.

CALLEJEO.

Descripción: Debido a su naturaleza curiosa y social, los perros a menudo se alejan de su territorio si tienen oportunidad. Los perros machos intactos pueden deambular en busca de una perra en celo. La escapada puede traer serias consecuencias, inclusive lesiones debidas a accidentes automovilísticos, peleas con otros perros, transmisión de enfermedades y captura por los agentes de control animal. Casi todas las áreas urbanas poseen leyes que limitan el vagar de los perros.

Edad de aparición: A menudo aumenta con la madurez sexual (6 a 15 meses de edad):

Tratamiento:

- Castrar perros machos intactos.
- Proporcionar suficiente ejercicio en forma de juego y paseos con correa.
- Proporcionar una barrera en la propiedad, como una cerca.
- Proporcionar supervisión cuando el perro se encuentra en el área cercada.
- Hacer atractiva el área cercada equipándola con juguetes y actividades.

ANSIEDAD CANINA.

En ciertas situaciones algunos perros manifiestan reacciones de miedo profundas inapropiadas. Los perros pueden desarrollar estas reacciones excesivas de miedo debido a predisposición genética, socialización inadecuada, o una experiencia negativa. El dueño, sin darse cuenta, podría reforzar el comportamiento de ansiedad al tratar de consolar al animal cuando se presentan estas reacciones.

FOBIAS AL RUIDO.

Descripción: En respuesta a fuertes ruidos tales como truenos o fuegos artificiales, los perros que sufren de fobias al ruido pueden empezar a ir y venir nerviosamente, temblar, salivar en exceso, evacuar, intentar escapar, emitir sonidos, acobardarse, acurrucarse o esconderse. Las orejas están a menudo dirigidas hacia atrás y plegadas sobre la cabeza, y las pupilas pueden estar dilatadas.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Realice desensibilización sistemática y contracondicionamiento, usando volumen como gradiente.
- Ofrezca un área protegida donde el perro pueda refugiarse cuando oye fuertes ruidos.
- La terapia farmacológica para disminuir la ansiedad puede ser de ayuda.

ANSIEDAD DE SEPARACIÓN.

Descripción: Una reacción anormal de excesivo miedo al quedarse sólo, durante cuyo tiempo el perro exhibe una o más de las siguientes reacciones: destrucción (generalmente dirigida a lugares de salida), excesiva vocalización, evacuación, anorexia, nervioso ir y venir y salivación profusa. Cuando los dueños están presentes, el perro no exhibe estos comportamientos. Al tiempo que los dueños se preparan para salir pueden observar cómo los signos de ansiedad aumentan. Los dueños suelen describir estos perros como “mimosos”, o “pegajosos”. Estos perros no deberían dejarse solos hasta que el dueño haya implementado el programa de tratamiento y la ansiedad haya disminuido.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Sistemáticamente desensibilice el perro a los signos que indican nuestra salida de casa (ej., tomar las llaves, ponerse el abrigo).
- Implemente desensibilización sistemática a la ausencia, usando la duración de la ausencia como gradiente.
- Cuando los dueños se encuentran en la casa, deben fomentar la independencia del perro obligándolo a que permanezca sentado a cierta distancia de ellos.
- Disminuya la excitación asociada con los saludos y despedidas; los dueños deberían ignorar al perro durante diez a veinte minutos previos a la salida y posteriores al regreso.
- Contracondicione al perro a las ausencias dándole una golosina sabrosa y de larga duración, justo antes de salir.
- La terapia farmacológica para disminuir la ansiedad, puede ser beneficiosa.

- **NOTA:** Para perros con fobia a los truenos, puede ser difícil reproducir todos los aspectos de una tormenta (ej., caída de la presión atmosférica, viento y lluvia) en un protocolo de desensibilización. Además puede ser difícil evitar exponer al animal a un estímulo de fuerza máxima cuando se realiza el programa de desensibilización.

CONDUCTA ALTERADA EN GATOS

COMPORTAMIENTO NATURAL FELINO.

Los gatos domésticos son descendientes del gato salvaje africano y muchos de los comportamientos característicos de estos ancestros todavía se presentan en los gatos actuales. El conocimiento del origen y el propósito de tales comportamientos puede ayudar a los dueños de gatos a apreciar a sus compañeros felinos de una manera más completa y hacer que mejore la relación humana – animal.

- **Comportamiento social:** Aunque consideraba que los gatos eran animales no sociales, en la actualidad se reconoce que los gatos domésticos pueden formar agrupaciones sociales complejas. Los estudios han demostrado repetidamente que los gatos se agrupan en territorios o áreas en las que habitan y defienden contra extraños. En situaciones estables, los territorios de los gatos pueden superponerse en parte sin interacciones antagonistas manifiestas.
- **Comunicación:** El gato posee tres formas primarias de comunicación: vocal, visual, y olfatoria. La comunicación vocal conlleva una variedad de sonidos que expresan diferentes mensajes. La comunicación visual presente posturas corporales y expresiones faciales. Por ejemplo, la posición de las orejas, pelo y rabo puede dar información importante acerca del estado emocional del gato. La comunicación olfatoria juega un papel muy importante en la comunicación. La colocación de sustancias olorosas mediante el marcado facial, secreciones anales, y marcado de orina, constituye un importante medio de comunicación para el felino.
- **Comportamiento sexual:** Las gatas son paléstricas estacionales, con la mayor incidencia en el hemisferio norte entre los meses de enero a marzo y otra vez de mayo a junio. Si no son cubiertas, el celo dura alrededor de 10 días y la gata se vuelve más activa, con vocalizaciones y marcado con orina y secreciones glandulares. Agazapándose con el tercio posterior elevado y rodar en el suelo son posturas corporales que la gata puede manifestar durante el celo.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- **Comportamiento de ingestión:** En su pasado salvaje el gato se desarrolló como un cazador solitario con presas variadas y de tamaño pequeño. Esto llevó al gato a un patrón de alimentación de múltiples pequeñas comidas con una considerable variedad en la dieta. Muchos gatos domésticos alimentados ad libitum continúan este patrón de alimentación y muestran preferencia hacia una variedad de alimentos.
- **Comportamiento de eliminación:** Los gatitos empiezan a eliminar independientemente alrededor de las cuatro semanas de edad. Instintivamente prefieren eliminar en materiales de partículas finas con buen drenaje. La mayoría de los gatos explorarán un posible lugar, cavarán un hueco, y eliminarán orina o heces dentro de él en cuclillas. Los gatos generalmente cubren sus desechos.
- **Patrón de sueño:** Aunque se ha descrito tradicionalmente a los gatos como criaturas nocturnas, más bien prefieren el atardecer, lo cual significa que son más activos durante el atardecer y la noche. El gato promedio adulto ocupa diez horas del día durmiendo y otras cinco horas descansando.

EL GATO ENSUCIANDO LA CASA.

Aunque los gatos son animales muy exigentes, el problema felino del ensuciado de la casa continúa siendo su problema de comportamiento más frecuente. Muchos factores pueden contribuir al desarrollo del problema del ensuciado, inclusive problemas médicos subyacentes. Se recomienda una investigación médica completa en todos los casos de ensuciamiento de la casa en los gatos.

Cuando el problema de eliminación persiste luego de descartarse o remediarse un problema médico, debe obtenerse un diagnóstico de la conducta. La primera distinción que debe hacerse es la de determinar si el gato está realizando un comportamiento de marcado o está seleccionando un lugar distinto a la caja-letrina para sus eliminaciones. El diagnóstico, se obtiene tras revisar el historial y las circunstancias en la casa y determinará el programa de tratamiento.

Investigación médica.

Historia Clínica

Eliminación inadecuada de orina.

- Examen médico
- Análisis de orina vía cistocentesis
- Cultivo de orina sensibilidad
- Análisis de sangre con recuento celular completo y perfil químico
- Imágenes (radiografías, ecografías).
- Endoscopia para evaluar el tracto urinario inferior si está indicado.

Eliminación inadecuada de heces.

- Examen médico
- Examen Rectal (incluso glándulas anales)
- Examen de flotación de heces.
- Pruebas adicionales de heces si esta indicado.
- Radiografías si esta indicado.
- Colonoscopia si esta indicado.

COMPORTAMIENTO DE MARCADO.

Descripción: El marcado con orina es una forma normal de comunicación entre los gatos.

Está asociado con dos posiciones diferentes:

- **Posición de pié** con las patas posteriores extendidas verticalmente y el rabo tieso hacia arriba; el rabo tiembla generalmente, y el gato puede pisar alternativamente con las patas posteriores mientras rocía con orina una superficie vertical.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- **Posición en cuclillas** cuando una pequeña cantidad de orina es depositada en una superficie horizontal.

Los objetivos del marcado de orina pueden ser varios, pero a menudo comprenden el perímetro del territorio u objetos socialmente significativos, como la ropa del dueño o artículos recientemente introducidos en la casa.

Aunque el marcado con orina es un comportamiento natural para los gatos, es obviamente inaceptable que ocurra dentro de la casa. Este problema se presenta en aproximadamente 10% de los machos castrados antes de la pubertad y en 5% de las gatas esterilizadas en la prepubertad.

El marcado con orina puede ser debido a un comportamiento territorial, comportamiento sexual, comportamiento reactivo, o ansiedad/tensión. El comportamiento de marcado territorial puede estimularse debido a la presencia de varios gatos que comparten un área común de convivencia, época de celo, o la llegada de nuevos gatos al territorio. Las situaciones que evocan ansiedad o tensión en un gato (como la llegada de un nuevo miembro familiar o un cambio dramático en los horarios de trabajo) pueden también llevar al marcado con orina. La caja para eliminación se continuará usando para las defecaciones y micción rutinarias.

El gato ensuciando la casa

Marcado (Comportamiento De comunicación)			Eliminación inadecuada (Elección de un nuevo lugar para eliminar)		
Sexual/ Territorial	Relacionado con Ansiedad	Reactivo	Médico	Aversiones/ preferencias	Relacionado con ansiedad

Edad de aparición: **Generalmente** se presenta después de la madurez sexual (6 meses o mayor).

Tratamiento:

- Castre a los machos y esterilice a las hembras.
- Identifique y elimine los estímulos desencadenantes del marcado, si es posible (ej. deje de alimentar a gatos callejeros dentro del territorio, bloquee la vista desde la ventana).
- Identifique los problemas y modifique el entorno social (ej. colóqueles campanillas a otros gatos de la casa para que el paciente sea alertado de su presencia, programe un horario para interacción con el dueño, separe los gatos en la casa durante varias horas cada día).
- Cambie la función del área previamente marcada a un área de comida o de juego.
- Haga aversivas las áreas marcadas.
- Trate el entorno con una feromona facial (Feliway Laboratorios Abbott).
- Localice las áreas ensuciadas y límpielas con productos enzimáticos.
- Prescriba terapias farmacológicas, de ser necesario.

ELIMINACIÓN INADECUADA.

Descripción: En la eliminación inadecuada, los gatos cambian sus áreas de eliminación a otros lugares de la casa. El problema puede ser tanto con la orina como con las heces. La eliminación inadecuada puede provocarse debido a diversas causas.

- **Problemas Médicos.-** Cualquier enfermedad causante de poliuria puede resultar en eliminación de orina fuera de la caja-letrina a causa de la frecuencia o urgencia asociada con la eliminación. A los gatos artríticos de edad avanzada podría dificultárseles el acceso a la letrina. Los gatos que sufren una experiencia dolorosa en la letrina al defecar, podrían evitar la caja para futuras defecaciones.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- **Aversión a la caja-letrina.**- Si la caja está sucia, los gatos con frecuencia escogen otro lugar más limpio para evacuar. El nivel de tolerancia a la suciedad difiere en cada gato.

DIFERENCIACIÓN ENTRE LA MICCIÓN INADECUADA Y EL MARCADO CON ORINA.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL	MICCIÓN INADECUADA	MARCADO CON ORINA
Uso de la caja letrina	Generalmente deja de usar la caja	Continúa usando la caja para Orinar normalmente
Cantidad de orina	Vaciado completo de la vejiga	Pequeños depósitos de orina
Área objeto	Textura adecuada (como una Alfombra)	Las áreas objetos tienen una significación conductista, como El olor del dueño
Conducta de Defecación	A menudo acompañada de la defecación fuera de la caja	Continúa usando la caja letrina para la defecación
Signos preliminares	Signos de aversión a la caja como Pararse con las patas separadas Sobre ella, sacudir las patas	Precedido de estímulos desencadenantes como un nuevo gato o miembro de la casa

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- **Preferencias.-** Los gatos pueden desarrollar una preferencia por un lugar o sustrato, lo que significa que han encontrado un lugar o material (ej. la alfombra) que prefieren utilizar en el momento de evacuar. Si los antecedentes del gato sugieren que siempre escoge un determinado sustrato para evacuar, se debe investigar esta causa atentamente. El gato puede escoger más de un sitio para eliminar.
- **Ansiedad.-** Una situación del entorno o experiencia negativa puede hacer que el gato evite la letrina.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Trate los problemas médicos.
- Limpie las áreas ensuciadas con productos enzimáticos.
- Limite el acceso a las áreas ensuciadas mediante confinamiento o supervisión.
- Haga la caja letrina más atractiva:
 - a. Ofrezca diferentes opciones de letrinas para escoger e identifique el tipo favorito de granulado, profundidad del mismo, etc.
 - b. Coloque cajas en diferentes lugares.
 - c. Mantenga las cajas letrinas muy limpias.
- Haga aversivas las áreas ensuciadas.
- Si la eliminación inadecuada ocurre en lugares específicos, coloque una caja letrina en esos lugares hasta que el gato los use de manera consistente; mueva gradualmente (-2 cm/día) hacia un lugar más apropiado.
- Recompense el uso adecuado de la letrina.
- Prescriba terapia farmacológica para disminuir ansiedad si está indicado.

COMPORTAMIENTO FELINO AGRESIVO.

Nota de precaución: Un gato que se encuentra en un estado excitado o agresivo **NO** debe manipularse, Instruya al dueño para que permita que el gato se calme **Antes de intentar interactuar con el animal.**

AGRESIÓN DEBIDA A LA POSICIÓN JERARQUICA SOCIAL.

Descripción: Aunque los gatos son cazadores solitarios, a menudo desarrollan relaciones con otros gatos. Como en otras especies sociales, se establecen rangos jerárquicos relativos entre los miembros del grupo para facilitar una coexistencia armoniosa. En una casa, pueden surgir problemas cuando se presenta un cambio en la situación en la casa, que altera la jerarquía de dominancia establecida.

Objeto: Otros gatos en el grupo social.

Edad de aparición: Puede ocurrir a cualquier edad pero el problema puede aparecer entre gatos previamente amigables cuando se alcanza la madurez sexual de los 1 a 4 años de edad.

Tratamiento:

- Identifique al agresor y la víctima.
- Separe los gatos cuando no estén supervisados.
- El agresor debería confinarse a un espacio menos atractivo.
- La víctima debería tener acceso a un espacio más atractivo.
- Coloque collar y campanilla al gato agresor.
- Frote los gatos con la misma toalla varias veces al día para intercambiar sus olores.
- Reúnelos durante periodos supervisados (utilice trasportines o barreras de ser necesario).
- Utilice corrección a distancia para interrumpir el comportamiento agresivo.
- Gradualmente permita mayor interacción entre los gatos.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- Considere terapia farmacológica de ser necesario.

AGRESIÓN PROVOCADA POR ACARICIAMIENTO (Agresión de afirmación de Autoridad)

Descripción: Los gatos que manifiestan esta forma de agresión, toleran e incluso solicitan, y parecen disfrutar las atenciones antes de volverse y morder la mano que los acaricia. Generalmente manifiestan algunos cambios de postura corporal justamente antes de morder (ej. agitan el rabo de un lado a otro, las orejas hacia atrás, el cuerpo en tensión y las pupilas dilatadas). Esta agresión puede ser parte de un mayor problema de control.

Objeto: Personas.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Evite limitar físicamente al gato cuando interactúe con él.
- Desensibilice sistemáticamente al acariciamiento empezando con periodos muy cortos de caricias y recompense con golosinas. En sucesivas interacciones gradualmente aumente la duración de las caricias.
- Los dueños deben interrumpir cualquier interacción tan pronto adviertan las posturas corporales que preceden a la mordida; los dueños pueden ponerse de pie y dejar caer el gato de su regazo o salir del recinto.
- La corrección a distancia puede usarse con precaución.

AGRESIÓN RELACIONADA AL JUEGO.

Descripción: Los gatos, especialmente los gatos jóvenes necesitan alternativas adecuadas para el juego. Si estas necesidades no son cubiertas, algunos gatos usarán a sus dueños como objetos de juego. Si los gatos se excitan demasiado o se asustan, pueden herir a sus dueños o a otras personas. Un comportamiento de juego de forma extralimitada hacia otro animal de compañía de la casa puede producir problemas. Dentro de la secuencia del juego, el dueño puede notar muchos componentes del comportamiento predatorio.

Objeto: Personas y otros animales de la casa.

Edad de aparición: Generalmente gatitos y gatos jóvenes (1 a 24 meses) pero puede ocurrir a cualquier edad.

Tratamiento:

- Proporcione juego interactivo diario con juguetes.
- El dueño debería iniciar los periodos de juego.
- Interrumpa el comportamiento de juego inapropiado con corrección a distancia o salga de la habitación.

AGRESIÓN PREDATORIA.

Descripción: Uno de los comportamientos naturales del gato consiste en cazar objetos pequeños que se mueven con rapidez. Los objetivos frecuentes del comportamiento predatorio son pequeños roedores o pájaros; sin embargo, algunos gatos atacarán manos o pies humanos o a un niño. El comportamiento comienza con un acecho silencioso, a menudo con la cabeza agachada y con movimientos nerviosos en el rabo. De repente el gato saltará sobre su objetivo.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

Objeto: **Generalmente** pequeños animales salvajes; también manos o pies humanos o un niño.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

Agresión a Animales Salvajes.

- Limite el acceso usando barreras físicas ó productos de barrera electrónica
- Coloque una campanilla al collar del gato para alertar a la posible presa (en cualquier caso, muchos gatos consiguen cazar a pesar de la campanilla).
- Realice corrección a distancia al principio de la secuencia predatoria.

Agresión a Humanos.

- Proporcione actividades y juegos donde el comportamiento predatorio pueda dirigirse a juguetes apropiados.
- Evite actividades que estimulen al gato a “cazar” manos o pies.
- Realice corrección a distancia al principio de la secuencia predatoria.
- Si los niños son atacados, el gato deberá ser separado de los niños.
- Proporcione otro gato de edad similar como posible distracción.

AGRESIÓN REDIRIGIDA.

Descripción: Un gato se irrita o agita debido a algo presente en el entorno y redirige la agresión al objetivo más próximo.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Evite gatos asustados o excitados; no intente acariciarlos, calmarlos, o interactuar de ninguna manera con ellos.
- **“Si es necesario, ponga al gato en aislamiento social hasta que se haya calmado”.**
- Identifique el estímulo que provocó la agresión y evite la exposición repetida al mismo, o desensibilice sistemáticamente y contracondicione el gato al estímulo.

AGRESIÓN TERRITORIAL.

Descripción: Los gatos pueden manifestar agresividad en un intento de alejar intrusos de su territorio. El objeto más frecuente de las agresiones territoriales son otros gatos, aunque también las personas y otros animales pueden serlo. Resoplidos, vocalización, acecho y persecución pueden observarse en el gato territorialmente agresivo. Los gatos que han convivido en armonía en la misma casa, pueden empezar a mostrar agresividad territorial. Esto puede deberse al proceso de maduración o a un suceso en particular, como cuando separamos temporalmente a dos gatos y luego los volvemos a juntar. Los machos adultos intactos son los que con más frecuencia utilizan agresión territorial, pero esta conducta puede observarse en animales enteros o castrados de ambos sexos.

Objetivo: Generalmente otros gatos, raramente personas u otros animales.

Edad de aparición: Generalmente tras la madurez sexual (6 meses o más)

Tratamiento:

- Castrar machos intactos.
- Si agresión se produce entre dos gatos de la casa, realice desensibilización sistemática y contracondicionamiento.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- Si la agresión está dirigida a gatos ajenos, bloquee la vista al exterior y dificulte el acceso de otros gatos a la propiedad.

COMPORTAMIENTO FELINO DESTRUCTIVO.

MORDISQUEO.

Descripción: Aunque los gatos no son tan amigos de mordisquear objetos como los perros, algunos gatos si causan daños a la propiedad y arriesgan su salud cuando mordisquean artículos de la casa. En el juego y exploración normales, algunos gatos muerden los cordones de zapatos y los cables eléctricos. Otros gatos mordisquean materiales específicos como algodón, lana o plástico, lo cual puede ser un comportamiento incontrolado obsesivo, particularmente en razas orientales. Algunos gatos ingieren el material poniéndose a riesgo de serias complicaciones como la obstrucción intestinal.

Edad de aparición: Generalmente gatitos o gatos jóvenes.

Tratamiento:

- Limite el acceso a los artículos objeto o hágalos aversivos.
- Proporcione juego interactivo supervisado diariamente.

Mordisqueo Obsesivo Incontrolado.

- Proporcione artículos para morder (ej. gama, artículos de cuero para morder empapados en jugo de atún, juguetes inofensivos y variados para gatos).
- Proporcione un horario regular de juego interactivo con el dueño.
- Haga aversivos los artículos objeto.
- Identifique cualquier desencadenante de ansiedad y elimínelo, desensibilice el gato a los desencadenantes.
- Prescriba terapia farmacológica de ser necesario.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

*Según las investigaciones, el 75% de los gatos de más de 2 años de edad sufren de algún grado de enfermedad gingival o periodontal.

INGESTIÓN DE PLANTAS CASERAS.

Descripción: Los gatos a menudo ingieren plantas de la casa bien sea como parte del juego y exploración o para satisfacer alguna necesidad nutricional de fibras. Debe realizarse un reconocimiento físico completo (incluyendo inspección oral) para eliminar cualquier problema oculto. Debido a que muchas plantas caseras son tóxicas si se ingieren, esto podría llegar a convertirse en un problema serio.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- No permita el acceso del gato a las plantas o aplique sobre éstas sustancias que las hagan aversivas.
- Sumínstrele al gato plantas inofensivas para que las consuma (ej. hierbas de trigo, gama de césped.
- Proporcione diariamente juego interactivo con juguetes apropiados.
- Aliméntelo con una dieta seca lata en fibra.
- Realice corrección a distancia para el mordisqueo de plantas inadecuadas.

ARAÑADOS.

Descripción: Los gatos producen el mayor daño a la propiedad cuando arañan. Arañar es un comportamiento natural dirigido a varios objetivos inclusive colocar una marca olfativa, marcado visual, extensión muscular y cuidado de las uñas. Los gatos que viven afuera, a menudo escogerán un árbol para arañar repetidamente. Esto les proporciona una oportunidad para marcar su territorio y eliminar la cubierta externa de sus garras. Los gatos

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

que viven adentro tienen las mismas necesidades de arañar pero a menudo seleccionan un artículo objeto inapropiado como los muebles. Los gatos muestran una preferencia para arañar tejidos con fibras orientadas longitudinalmente. Los palos para arañar son atractivos, cuando son estables y se encuentran situados en lugares sobresalientes del entorno. Aunque la mayoría de los gatos arañan superficies verticales, algunos prefieren arañar superficies horizontales. Muchos gatos seleccionan un artículo cercano a su lugar de descanso para el arañado. Cuando intente rehabilitar un gato que araña en un lugar inapropiado, o intente prevenir que lo haga, es importante recordar que los gatos escogerán un objeto para arañar basándose en la localización y textura del material. Una vez que el objeto ha sido seleccionado tienden a volver repetidamente al mismo objeto y lugar para arañar. Los dueños a menudo reemplazan los palos para arañar, cuando muestran signos de desgaste porque les es desagradable a la vista. En realidad, cuanto más desgastados estén más atractivos serán para el gato y no se deberían reemplazar.

Edad de aparición: No se relaciona con la edad.

Tratamiento:

- Identifique las preferencias del gato en cuanto a localización, tejido, y orientación (vertical u horizontal).
- Proporcione un palo para el arañado que sea consistente y atractivo.
- Sitúe los palos para el arañado en lugares sobresalientes, cerca de las áreas donde el gato descansa y próximos a los objetos previamente arañados.
- Haga los objetos inadecuados del arañado inaccesibles (retire el artículo o separe al gato del objeto cuando no pueda supervisarlos) o aversivos (ej. cubra con plástico, papel de aluminio, etc.).
- Estimule y recompense el uso adecuado de los palos con alabanzas o golosinas.
- Puede usarse la corrección a distancia (ej. chorro de agua) para inhibir el arañado de objetos inadecuados al principio del comportamiento.
- Córtale las uñas regularmente.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- Considere la aplicación de cubiertas de goma para las uñas (Soft Paws) (Garras Suaves) para prevenir daños. Soft Paws (Garras Suaves) son cubiertas para las uñas de goma flexible, que cubren las garras y así previenen el daño generalmente asociado con el arañado. Las cubiertas Soft Paws (Garras Suaves) se aplican a las uñas usando un adhesivo y necesitan ser reemplazadas una vez al mes aproximadamente.
- Oniquectomía (extirpación de uñas) quirúrgica es una opción si otros tratamientos fallan.

BIBLOGRAFÍA

1. Ávila Escalera E. 1998."Comportamiento del Perro". Perros Pura Sangre. 15:9, 16-20.
2. Ávila Escalera E. 1995 a. "El Perro Domestico y su relación con el ser humano". VEPE Cuadriservicio 9:106, 3-7.
3. Ávila Escalera E. 1995 b."Comportamiento del Perro". VEPE Cuadriservicio. 17:4, 9-12.
4. Ávila Escalera E. 1995 c. "Importancia de las Mascotas para el beneficio Humano". VEPE Cuadriservicio. 15:12, 8-12.
5. Arjona C. D. 1999 a. "Hablando de entrenamiento". Perros Pura Sangre. 16:1, 15-20.
6. Arjona C. D. 1999 b. "Reglas de entrenamiento". Perros Pura Sangre. 16:3, 31-38.
7. Arjona C. D. 1999 c. "El Entrenador ". Perros Pura Sangre. 16:4, 30-38.
8. Arjona C. D. 1999 d. "Hablando de Instructores, Entrenadores y Agitadores". Perros Pura Sangre. 16:8, 34-38.
9. Arjona C. D. 1999 e. "La llegada del cachorro". Perros Pura Sangre. 16:11, 28-34.
10. Arjona C. D. 1999 f. "El Entrenamiento". Perros Pura Sangre. 16:12, 24-30.
11. Berruecos Vila 1998. "Perros escucha para sordos". Perros Pura Sangre. 15:10, 10-14.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- 12.** Bergen Bonita 1994. “Animales de asistencia mitos y magias”. VEPE Cuadriservicio. 15:11, 14-16.
- 13.** Bergen Bonita 1995. “Efectos socializantes de los perros de servicio para las gentes discapacitadas”. VEPE Cuadriservicio. 16:5, 10-12.
- 14.** Bonilla L. 1989. “Historia y Psicología del perro”. ED. Tecnos. Madrid, España.
- 15.** Cosnier J. 1990. “Neurosis experimentales”. ED. Taller ediciones JB.
- 16.** Clutton Juliet-Brock 1994. “Eyewitness guide”. Altea 32: Dog.
- 17.** Douglas Schmalz. 1985. “Introducción a la psicología fisiológica”. ED. Taller ediciones JB.
- 18.** Dunbar I. 1991. “The Sirius puppy training manual”. Kenneth Publishers. Oakland, California.
- 19.** Davey G. 1981. “Animal learning and conditioning”. The Macmillan Press LTD. Hong Kong.
- 20.** Ey, H 1982. “Psiquiatría Animal”. ED. Casas S.A. México.
- 21.** Fogle B. 1992. “The dogs mind”. Macmillan Publishing Company. New York.
- 22.** Giffroy J. M. 1988. “Apprendisage et Therapies Comportamentales. Revue Med. Vet. 139, 11:1073-1080.
- 23.** Guajardo Oviedo. 1992. “Sí a la Vida”. Mundo de Mascotas. 3:11, 12-15.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

- 24.** Hart B.L, Hart L.A. 1989. "Canine and Feline Behavioral Therapy. Lea and Febiger, Philadelphia.
- 25.** Kingommer, Salka y Cowin. 1988 a. "Etología en Pequeñas Especies (I). Departamento de Etología y Ciencias Biológicas, Universidad de West Lafayette. VEPE Cuadriservicio. 10:4.
- 26.** Kingommer, Salka y Cowin. 1988 b. "Etología en Pequeñas Especies (II). Departamento de Etología y Ciencias Biológicas, Universidad de West Lafayette. VEPE Cuadriservicio. 15:5.
- 27.** Krall Peter. 1974. "Anomalías del Comportamiento. El Perro Sano y Enfermo. 2:9edicion CECSA. México.
- 28.** Klever Ulrich. 1995. "Todo sobre tu Perro, Etología. El Perro Tiene su Comportamiento. Ed. Everest.
- 29.** Manning, A. 1991. "Introducción a la Conducta Animal". ED. Alianza Universal.
- 30.** Martínez M. 2000. "El Valor Terapéutico de los Animales de Compañía en los Centros de Readaptación Social en México. Perros Pura Sangre. 17:3, 44-48.
- 31.** Menchero A. 1999. "Manual de Adiestramiento del Perro". ED. AEDOS, Barcelona, España.
- 32.** O'Farrel V. 1990. "Behavioral Problems in Companion Animals. Ed. Chapman and Hall London, England.
- 33.** Overall. VMP. 1994. "Prevención de los Problemas de Conducta, Detección Temprana en Cachorros. Periodos de Aprendizaje. Universidad de Pensilvania. VEPE Cuadriservicio. 15:10, 1-8.

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

34. Peters R. 1980. "Mammalian Communication". Brooks/ Cole Publishing. California, USA.
35. Payro Dueñas J.L. 1981. "El Perro y su Mundo". CIA. Editora, S.A. México.
36. Rodríguez Argüelles N. 1991. "Los Perros del Mundo". Federación Cubana del Deporte Canino. 3:21.
37. Rosaldo B.F 1995. "El Castigo en los Perros una Terapia del Comportamiento". Revista AMMVEPE. : 33, 410-414.
38. Ross J. 1992. "Dog Talk". St. Martin's Press, New York. USA-.
39. Sierra I. 1992. "El Bóxer". ED. AEDOS Barcelona, España.
40. Sierra I. 1995. "Psicología del Perro". ED. AEDOS Barcelona, España.
41. Tarpv R.M. 1990. "Principios Básicos de Aprendizaje". Editorial Debate.
42. Timbergen Niko. 1982. "Conducta Animal". TIME LIFE. La Maquinaria del comportamiento.
43. Tortora D. 1990. "The Right Dog for You". Ed. Simon and Schuster. New York USA.
44. Valadez Azúa R. 1997. "Del Insectívoro al Perro, Estado Actual de Nuestro Conocimiento sobre el Origen y Evolución de los Canidos. AMMVEPE 8:4, 165-171.
45. Valadez Azúa R. 2000. "El Origen del Perro". AMMVEPE. 11:3, 75-84.
46. Vilá C. 1997. "Multiple and Ancient Origins of the Domestic Dog. Science 276: 1687-

Trastornos del Comportamiento en Caninos y Felinos

1689.

47. Vives J.F. 2000. “El Pastor Alemán Excelente como Perro de Búsqueda en Catástrofes. Siguiendo la Huella. 1:4, 39-41.

48. Voith V.L. 1983. “Behavioral Disorders”. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Ettinger, Stephen J WB. Saunders Company.

49. Volhard J. 1989. “Teaching Dogs Obedience Classes. Howell Books House Inc. New York USA.

50. Whyham A. 1993. “El Hombre y los Animales de Compañía”. VEPE Cuadriservicio. 15:6, 10-12.